

Опис

Комплексна дія дієтичної добавки зумовлена синергічними ефектами біологічно активних речовин, що входять до її складу. Комбінована рослинна дієтична добавка, завдяки наявності цитратного комплексу, сприяє дезінтеграції та виведенню ниркових каменів і каменів сечовивідного каналу. Уриклар виявляє спазмолітичні властивості, сприяє проходженню каменів по сечовивідних шляхах, покращує функцію нирок та підвищує діурез. Чинить протимікробну і протизапальну дію. Регулює кристало-колоїдний баланс, знижує концентрацію в сечі елементів, що зумовлюють утворення каменів (щавлева кислота, кальцій, гідроксипролін). Перешкоджає акумуляції часток навколо ядра каменя, що запобігає його подальшому підвищенню. При одночасному застосуванні з іншими уросептиками Уриклар підсилює їх бактерицидний ефект.

Подрібнене лушпиння квасолі звичайної містить бетаїн, аргінін, тирозин, холін, макро- та мікроелементи. Основна дія — сечогінна, антибактеріальна. Покращує мікроциркуляцію у нирках. Використовується при запаленнях нирок та набряках, спричинених захворюваннями нирок.

Сухий екстракт листя берези плосколистої містить ефірні олії, сапоніни, фітонциди, дубильні речовини, смоли, аскорбінову та ніотинову кислоти. Основна дія — діуретична, жовчогінна, спазмолітична, протизапальна, антибактеріальна.

Сухий екстракт кореня петрушки кучерявої містить апоніл, міристицин, флавоноїди, що підвищують тонус сечового міхура. Основна дія — діуретична, протизапальна, літолітична.

Сухий екстракт листя брусниці звичайної містить глікозид арбутин, флавоноїди, органічні кислоти (яблучну, лимонну, винну, урсолову, галову та елагову), аскорбінову кислоту. Основна дія — антимікробна, сечогінна, протизапальна. Стимулює виділення з сечею надлишкового азоту та сечовини. Використовується при сечокам'яній хворобі, запаленні сечового міхура, гломерулонефриті.

Сухий екстракт трави ромашки лікарської має антибактеріальний, протизапальний, репаративний, в'язучий, антиоксидантний та спазмолітичний ефекти.

Натрію та калію цитрат мають ефект залуження та використовуються при сечокам'яній хворобі, спричиненій уратними, цистиновими та кальцієвими каменями. Це пов'язано зі здатністю цитратного комплексу перешкоджати акумуляції солей та підвищувати розчинність оксалатів та уратів.

Протипоказання

Період вагітності та годування грудьми, гострі запальні захворювання нирок та сечового міхура, індивідуальна чутливість до компонентів.

Особливості застосування

Не рекомендується вживати дієтичну добавку при індивідуальній непереносимості рослин родини складноцвітних (Asteraceae), оскільки містить екстракт ромашки. Необхідно дотримуватися обережності при появі набряків, спричинених серцевою та нирковою недостатністю. Підсилює дію антисептиків та антибіотиків при одночасному застосуванні, при одночасному прийомі засобів з цитратним комплексом необхідно контролювати рН сечі. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

У якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, ефірних олій, дубильних речовин, каротиноїдів, фітонцидів, органічних кислот з метою нормалізації функціонального стану сечовидільної системи та обміну речовин (зокрема фосфору, кальцію і сечової кислоти). Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Уриклар, мають сечогінні та протизапальні властивості; сприяють запобіганню утворенню каменів в нирках та сечовидільних шляхах. Вживання дієтичної добавки Уриклар сприяє позитивним змінам мікроскопії сечового осаду (зниження еритроцитурії, кристалурії).

Діючі речовини дієтичної добавки Уриклар здійснюють вплив на метаболічні процеси пуринового обміну та показники оксалурії, забезпечують позитивні зміни рівня сечової кислоти крові, зменшення кількості уропатогенних бактерій як причини утворення депозитів оксалату кальцію. Наявність цитратних комплексів сприяє літолітичній дії та профілактиці утворення нефролітів (запобігає кристалізації уратів та оксалатів).

СПОСІБ ВЖИВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ДОЗА: дорослим та дітям віком від 6 років та старше — по 1 капсулі 2-3 рази на добу, запиваючи невеликою кількістю питної води. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.