Опис

Функціональні властивості УроПак-36: обумовлені фізіологічною активністю біологічно-активних речовин, що входять до складу екстракту ягід журавлини великоплідної: проантоціанідину А, флавоноїдів (флавонолів, флавононів та їх глікозидів: кверцетину, кемпферолу, мірицетину, гесперидину); цукрів; органічних кислот (бензойної, урсулової, хінної); дубильних речовин; вітамінів: А, С, Е, РР, групи В; пектинів; макро- та мікроелементів: калію, магнію, фосфору, заліза.

У кожній капсулі УроПак-36 міститься 144 мг екстракту журавлини, що відповідає 36 мг проантоціанідину А. Проантоціанідини (PAC) - це природні речовини, що викликають пошкодження бактерійної оболонки, перешкоджають розмноженню та прилипання (адгезії) бактерій на епітелії сечовивідних шляхів. Проантоціанідин А, який входить до складу УроПак-36, перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів на поверхні епітелію сечовивідних шляхів. Здатність екстракту журавлини блокувати адгезію патогенних мікроорганізмів до уроепітелію (слизових оболонок сечовивідних шляхів) стосується не тільки E.coli, яка є причиною близько 90% випадків інфекцій сечовивідних шляхів, а й інших, широко поширених збудників інфекцій сечовивідного тракту. Даний ефект сприяє швидкому вимиванню збудників, запобігаючи колонізації сечовидільної системи мікроорганізмами й, як наслідок, розвитку запалення.

Одна капсула УроПак-36 містить 36 мг PAC, що є достатнім добовим дозуванням, згідно з Рекомендаціями Європейської Асоціації Урологів, 2011 р.

Біологічно активні речовини, що входять до складу УроПак-36, сприяють посиленню дії антибіотиків та антисептиків, що застосовуються при інфекціях сечовивідних шляхів, запобігають розвитку рецидивів при запаленнях сечового міхура (циститах).

УроПак-36 також підкислює сечу, створюючи таким чином несприятливе середовище для росту та розмноження патогенних бактерій. Підвищення рівня кислотності сечі також перешкоджає з'єднанню іонів кальцію і фосфатів, що беруть участь у формуванні нерозчинних каменів, таким чином запобігають розвитку сечокам'яної хвороби.

УроПак-36 рекомендований з метою нормалізації функціонального стану сечовидільної системи при гострих та хронічних запальних захворюваннях (при загостренні рецидивуючого хронічного бактеріального циститу, гострому бактеріальному циститі, пієлонефриті, неспецифічному бактеріальному уретриті,

безсимптомній бактеріурії у вагітних, інфекціях сечовивідних шляхів після урологічних маніпуляцій та операційного втручання) за рахунок протидії адгезії мікроорганізмів на поверхні епітелію сечовивідних шляхів та бактеріостатичним властивостям біологічно активних речовин екстракту ягід журавлини.

Біологічно активні компоненти, що входять до складу УроПак-36 сприяють зменшенню ризику виникнення інфекцій сечовивідних шляхів у осіб з рецидивуючими інфекціями сечовивідних шляхів (у тому числі, при дії стресових факторів, зміні клімату, несприятливих гігієнічних умовах), при постменопаузі, цукровому діабеті, а також у жінок, що ведуть активне статеве життя та/або використовують механічні пристрої для контрацепції.

Показання

По рекомендації лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів - проантоціанідин А, флавонолів, флавонони і їх глікозидів: кверцетину, кемпферол, мірицетин, гесперидин; цукрів; органічних кислот (бензойної, урсулової, хінної) дубильних речовин; вітамінів: А, С, Е, РР, групи В; пектинів; макро- і мікроелементів: калію, магнію, фосфору, заліза з метою нормалізації функціонального стану сечовидільної системи при гострих і хронічних запальних захворюваннях (в т.ч. при безсимптомній бактеріурії у вагітних) за рахунок протидії адгезії мікроорганізмів на поверхні епітелію сечовивідних шляхів і бактеріостатичним властивостям біологічно активних речовин екстракту ягід журавлини.

Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, цукровий діабет.

Спосіб застосування та дози

Дітям у віці від 3 до 4 років приймати з розрахунку по 0,3 ml (мл) на 1 кг маси тіла 1 раз на добу,

Дітям у віці від 4 років і старше (вагою від 17 кг) - по 5 ml (мл) (чайна ложка) 1 раз на добу.

Перед застосуванням збовтати. Приймати після їжі, бажано ввечері, запиваючи невеликою кількістю питної води. Можна за смаком розбавляти питною водою.

Термін застосування визначається індивідуально з урахуванням характеру та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого ефекту, сприйнятливості УроПак-36® і, як правило, становить 1 місяць.

При необхідності курс застосування можна повторити через 1-2 місяці.

Особливості застосування

Рекомендовано застосовувати повноцінний і збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь. Для збільшення діурезу доцільно випивати не менше 2 літрів рідини на добу, особливо особам із сечокам'яною хворобою.

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4°C до 25°C у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл сиропу у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці.

Виробник

ТОВ "Біхелс", Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:

Україна, 24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.

Склад

100 мл (ml) містять: активний інгредієнт: екстракт ягід журавлини великоплідної (Vaccinium macrocarpon), порошкоподібний (30% проантоціанідинів) - 2,4 г (g), консервант: сорбат калію, допоміжні речовини: глюкозо-фруктозний сироп, вода очищена до 100 мл (ml).