

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять: Conium 1000CH 20 мг, Sabal serrulatum 50CH 20 мг, Thuja 1000CH 20 мг, Calcium fluoratum 200CH 20 мг, Pulsatilla 1000CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* цукор кондитерський.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Усуває дизуричні явища, поліпшує виділення сечі. Сприяє нормалізації рівня загальних естрогенів і підтриманню статевої функції. Перешкоджає росту аденоми.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

У складі комплексного лікування аденоми передміхурової залози I-II ступеня.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Можливе поєднання з будь-якими методами і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом повинен становити не менше 30 хвилин.

## **Особливості застосування**

Пацієнтам з рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази не слід застосовувати цей лікарський засіб.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – цукру кондитерського – проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Лікарський засіб не застосовують жінкам.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим слід приймати по 5 гранул під язик 1 раз на добу протягом 2-2,5 місяців, бажано в один і той же час. Для досягнення стійкого результату необхідно повторити курс лікування з інтервалом 2 тижні.

Гранули тримати під язиком, до повного розсмоктування, приймати за 15-20 хв до їди або через 1 годину після їди. За необхідності гранули розчинити у невеликій кількості води.

## **Діти**

Не призначають дітям.

## **Передозування**

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але в осіб з гіперчутливістю до компонентів лікарського засобу можливе посилення проявів побічних реакцій.

## **Побічні реакції**

Можливі реакції гіперчутливості.

**Термін придатності**

3 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка**

По 10 г у пеналі/флаконі з кришкою; по 1 пеналу/флакону в пачці з картону.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).