

## **Склад**

діюча речовина: липи квітки (*Tiliae flores*);

1 пачка містить: липи квіток (*Tiliae flores*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить: липи квіток (*Tiliae flores*) 1,5 г.

## **Лікарська форма**

Квітки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки квіток, квітконіжок і приквітків різної форми; жовтувато-білого, зеленувато- або жовтувато-сірого, світло-жовтого, жовтувато-зеленого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні засоби. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.

## **Показання**

Внутрішньо – при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо – при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½-1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ⅓ склянки, 7-12 років – по ¼ склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ½ склянки, 7-12 років – по ⅓ склянки, 3-7 років – по ¼ склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.