

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 капсула містить 200 мг гібіскусу екстракту сухого (hibisci extractum siccum);

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, повідон;

склад твердої желатинової капсули: желатин, титану діоксид (E 171), тартразин (E 102), амарант (E 123), еритрозин (E 127), патентований синій V (E 131).

## **Лікарська форма**

Капсули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* тверді желатинові капсули з кришечкою та корпусом бордового кольору, що містять порошок пурпурово-фіолетового кольору з білими вкрапленнями. Допускається наявність спресованих стовпчиків чи грудочок, які розпадаються при надавлюванні.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

## **Фармакодинаміка**

Патентований екстракт гібіскусу є джерелом органічних кислот (лимонна, оксибурштинова, пірокатехінова, гібіскова), вітамінів, полісахаридів, біофлавоноїдів, які зумовлюють бактеріостатичний ефект лікарського засобу Афлазин® щодо більшості збудників інфекцій сечовивідних шляхів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Candida spp.*). Він має протизапальні, протинабрякові властивості, проявляє антиадгезивний ефект, що унеможливорює адгезію (прилипання) мікроорганізмів до стінок сечовивідних шляхів, їх розвиток та розмноження. Запобігає розвитку дизуричних явищ.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалася.

## **Показання**

У складі комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит), при асимптоматичній бактеріурії, у тому числі у вагітних жінок.

Хронічні неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит), профілактика інфекцій сечовивідних шляхів, у тому числі після інструментальних втручань (ендоскопічні, рентгенологічні та гінекологічні дослідження).

Профілактика утворення сечових каменів, у тому числі після їх видалення.

### **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена. Афлазин® можна застосовувати у поєднанні з антибіотиками та іншими антимікробними засобами.

### **Особливості застосування**

Оскільки лікарський засіб містить лактозу, його не слід застосовувати пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препарату у I триместрі вагітності можливе тільки за призначенням лікаря. Застосування препарату у період вагітності починаючи з II триместру, а також у період годування груддю не потребує додаткової консультації лікаря.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим і дітям віком від 12 років застосовувати по 1 капсулі 2 рази на добу незалежно від прийому їжі. Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 капсулі 1 раз на

добу. Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально залежно від тяжкості захворювання. Рекомендована тривалість застосування при гострих запаленнях сечовивідних шляхів та загостренні хронічних захворювань становить 4–6 тижнів. Рекомендований курс застосування з профілактичною метою становить 2–4 тижні.

### **Діти**

Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років.

### **Передозування**

Випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції на складові компоненти препарату.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 10 капсул у блістері, 3 блістери в упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул.  
Грушевського, 60.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).