

## **Склад**

Carduus D1, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12 ,Phosphorus D12.

## **Властивості**

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень
- Попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах
- Покращує детоксикаційну функцію печінки
- Нормалізує процес желчеобразования і жовчовиділення

## **Фармакодинаміка**

Препарат Галстена® поєднує властивості гепатопротектора, холеретика і холекинетики, проявляє спазмолітичну і протизапальну дію на гепатобіліарну систему.

## **Фармакокінетика**

Не досліджувалась.

## **Показання**

Краплі оральні:

- лікування гострих і хронічних захворювань печінки, жовчовивідних шляхів і міхура;
- в комплексній терапії хронічного панкреатиту;
- для захисту та відновлення печінки при застосуванні антибіотиків, протизастудних, болезаспокійливих, протизапальних та інших гепатотоксичних препаратів та алкоголю.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Клінічно значуща взаємодія препарату Галстена® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

## **Властивості**

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень
- Попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах
- Покращує детоксикаційну функцію печінки
- Нормалізує процес желчеобранования і жовчовиділення

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не впливає або має незначний вплив.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

В даний час відсутні докази існування особливого ризику застосування лікарського засобу в період вагітності або годування груддю. Препарат слід застосовувати з обережністю в період вагітності та годування груддю і тільки у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода / дитини.

## *Фертильність*

Дані про вплив препарату на репродуктивну функцію відсутні.

## **Спосіб застосування та дози**

Галстена®, краплі оральні:

Дорослі і діти старше 12 років – по 10 крапель в чистому вигляді або розведеного в 1 столовій ложці води;

Діти, вік 5-12 років – по 5-7 крапель, розведених в 1 столовій ложці води;

Діти, вік 2-4 роки – по 2-4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води.

Приймати препарат 3 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого послаблення симптомів, рекомендований прийом препарату кожні ½-1 год до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3 діб, після чого приймати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту рекомендується приймати препарат Галстена® , краплі оральні, в проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1 год після прийому їжі), потримавши препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

При збільшенні вираженості симптомів, або в разі, якщо поліпшення не настає після 7 днів лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Курс лікування в залежності від характеру і тяжкості захворювання визначає лікар.

Зазвичай тривалість курсу лікування: гепатит, гепатоз, цироз печінки – не менше 3 міс. Хронічний холецистит, жовчнокам'яна хвороба, постхолецистектомічний синдром – 2-3 міс. При необхідності курс можна повторити через 1 міс. При дискінезії жовчовивідних шляхів тривалість курсу лікування – 2-3 тижнів. Для захисту клітин печінки після антибіотикотерапії та інших шкідливих впливів – 2-4 тижні.

## **Діти**

Застосовувати препарат Галстена®, таблетки, у віці від 6 років.

У віці від 6 до 12 років застосовується за рекомендацією лікаря.

Для лікування дітей у віці від 2 до 6 років можна застосовувати препарат Галстена® в формі крапель.

Застосування препарату Галстена®, краплі оральні, у дітей до 2 років не рекомендується через нестачу даних.

## **Передозування**

Випадки передозування не виявлені.

## **Побічні реакції**

У виняткових випадках у осіб з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів препарату можливі алергічні реакції. При появі будь-яких побічних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу і проконсультуватися з лікарем.

## **Умови зберігання**

Краплі оральні. У щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С.

## **Упаковка**

По 20 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

## **Виробник**

Ріхард Біттнер АГ, Австрія

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).