

Склад

діюча речовина: липи квітки (*Tiliae flores*);

1 пачка містить: липи квіток (*Tiliae flores*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить: липи квіток (*Tiliae flores*) 1,5 г.

Лікарська форма

Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки квіток, квітконіжок і приквітків різної форми; жовтувато-білого, зеленувато- або жовтувато-сірого, світло-жовтого, жовтувато-зеленого кольору.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні засоби. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинаміка

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.

Показання

Внутрішньо – при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо – при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

2 столових ложки квіток помістити в емальований посуду, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою и настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок от процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим и дітям віком від 14 років - по ½-1 склянки, дітям віком 12-14 років - по склянкам, 7-12 років - по склянкам, 3-7 років - по 2 столові ложки. Застройка для полоскання ротових порожков и горла 3-4 рази на добро. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакета и додати скляний или емальований посуду, залити 200 мл окропу, закрити и настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 1 склянцям, дітям віком 12-14 років - по ½ склянки, 7-12 років - по склянкам, 3-7 років - по ¼ склянки. Застройка для полоскання ротових порожков и горла 3-4 рази на добро.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 ° С не більше 2дб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появи побічних реакційних засобів додати припинити препарат и звернутись к лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Не застегивать після закрывання терміну придатности, обзначеного на упаковке.

Умови зберігання

Зерно в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Без рецепта.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., М. Житомир, шосе Київське, будинок 21.