

Склад

манітол; бетаїн ангідрид; L-аргінін гідрохлорид; L-орнітин L-аспартат; підсолоджувач: натрію цикламат; ароматизатор: лимон; регулятор кислотності: лимонна кислота; антиспікаючий агент: кремнію діоксид.

Без ГМО. Містить підсолоджувач.

Опис

Абертін дієтична добавка до раціону харчування – додаткове джерело: L-аргініну, бетаїну, L-орнітину L-аспартату, сприяє нормалізації функціонування печінки, попередженню наслідків гепатоксичної дії алкоголю, виведенню токсичних речовин з організму, нормальному метаболізму гомоцистеїну.

Активні компоненти

Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), здійснює регуляцію судинного тону, сприяє підтримці азотистого балансу, виведенню залишкового токсичного азоту, має антиоксидантну дію, нормалізує мікроциркуляцію в печінці, насичує її киснем, покращує показники гепатопортальної гемодинаміки.

Бетаїн надає антифібротическое і протизапальну дію, сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, зменшує ризик тромбоутворення і прогресування атеросклерозу, запобігає і зменшує жирову дистрофію печінки.

L-орнітин-L-аспартат (LOLA) має гепатопротекторну властивостями у пацієнтів з жировою інфільтрацією печінки різної етіології, а результати багаточентрового рандомізованого клінічного дослідження продемонстрували, що 12-тижневе лікування приймається всередину L-орнітином-L-аспартат (6-9 г/день) призводить до дозозалежного зменшення активності ферментів печінки і рівня тригліцеридів, а також до значних поліпшень співвідношень щільності печінки/селезінки на КТ.

Переваги

- покращує стан клітин печінки;
- зменшує кількість ліпідних відкладень в гепатоцитах;
- покращує обмінні процеси;
- позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи;
- має гепатопротекторні та дезінтоксикаційні властивості.

Рекомендації щодо застосування

- При порушенні функції печінки (гепатит, цироз, неалкогольний і алкогольний стеатогепатит і ін.);
- при інтоксикаціях різного походження (алкоголь, медикаменти, неякісні продукти харчування та ін.);
- для усунення наслідків кетоацидозу при ендокринних захворюваннях і ацетонемічному синдромі у дітей;
- при порушенні білкового, ліпідного і вуглеводного обмінів (стреси, астенія, травми, голодування);
- при порушеннях роботи серцево-судинної системи;
- для поліпшення функціонування репродуктивної системи у чоловіків і жінок.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу дієтичної добавки, дітям, вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Вміст одного чи кількох саше розчинити у склянці холодної мінеральної або питної води кімнатної температури та випити. Вживати по 1 саше 3 рази на добу з інтервалами 1-2,5 години.

Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.

Упаковка

10 саше в картонній коробці.

Виробник

ТОВ "Софарма", Україна.