

Склад

1 таблетка містить:

активну речовину: S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутандисульфонат 380 mg (mg) [в перерахунку на адеметіонін катіон – 200 mg (mg)];

допоміжні речовини: наповнювач: сорбіт (D-сорбіт); розпушувачі: целюлоза мікрокристалічна, полівінілпіролідон (кросповідон); стабілізатори: кремнію діоксид колоїдний водний, магнію стеарат; підсолоджувачі: аспартам, сахарин; ароматизатор: «Грейпфрут».

Без ГМО. Містить підсолоджувачі.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г) добавки: білки – 32,0 g (г); вуглеводи – 8,0 g (г); жири – 0 g (г); 670 kJ (кДж)/ 160 kcal (ккал).

Лікарська форма

Добавка дієтична.

Фармакологічні властивості

S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутандисульфонат (SAMe, адеметіонін) – натуральна амінокислота, що присутня практично у всіх тканинах і рідких середовищах організму. Адеметіонін насамперед діє як коензим і донор метильної групи у багатьох реакціях трансметилування, які є дуже важливими у мозковій тканині, завдяки впливу на метаболізм допаміну, адреналіну, норадреналіну, серотоніну, мелатоніну та гістаміну.

Адеметіонін є попередником в утворенні фізіологічних сульфурованих сполук (цистеїну, таурину, глутатіону, коензиму А та ін.) у реакціях транссульфурування. Глутатіон, найпотужніший антиоксидант, є важливим компонентом для печінкової детоксикації. Тому адеметіонін сприяє нормалізації функціонального стану печінки, порушеного внаслідок зловживання алкоголем, впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, вірусів, бактерій, лікарських засобів, під впливом стресів чи токсичних речовин.

Показання

За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело амінокислоти адеметіоніну з метою загального зміцнення організму, усунення дефіциту та покращення синтезу ендогенного S-аденозил-L-метіоніну в організмі, поліпшення білкового та ліпідного обміну. Адеметіонін сприяє відновленню ослабленої функції клітин печінки, підвищенню її стійкості до дії шкідливих факторів (алкоголь, фактори зовнішнього середовища, віруси, бактерії, лікарські засоби, токсичні речовини). Сублінгвальна форма добавки дієтичної забезпечує більш легке надходження адеметіоніну відразу в кровоток.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів; біполярний психоз; вік до 18 років, вагітність та період лактації.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Прийом добавки дієтичної перед сном, в тому числі на ніч (враховуючи супутній тонізуючий ефект адеметіоніну) – небажаний.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування протипоказане.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 таблетці 2 рази на добу за 30–60 хвилин до прийому їжі. Таблетки вживати сублінгвально, поклавши таблетку під язик і повільно розсмоктуючи протягом 15–20 хвилин до повного її розчинення.

Курс споживання – 30 діб. У разі необхідності курс можна повторити через 30 діб. Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом. Перед початком застосування рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Діти

Протипоказано до 18 років.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ «Київмедпрепарат».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.