

Склад

1 капсула містить:

- Екстракт насіння розторопші плямистої (силімарин) - 140 мг.
- Збагачені фосфоліпіди (лецитин) - 100 мг.
- Альфа-ліпоева кислота - 50 мг.

допоміжні речовини: (лактоза, крохмаль, кальцію або магнію стеарат) - 110 мг.

Фармакологічні властивості

- Дія препарату обумовлена властивостями вхідних в його склад збагачених фосфоліпідів (лецитину) і біологічно активних речовин, що містяться в екстрактах лікарських рослин: розторопші плямистої (насіння), артишоку (листя), куркуми (кореня) і цмину піскового (квітів).
- Дія всіх активних компонентів клінічно підтверджено.
- Збагачені фосфоліпіди і екстракти лікарських рослин, що входять до складу препарату, завдяки раціонально підбраної комбінації, а також співвідношенню компонентів, і комплексному впливу на гепатобіліарну зону, забезпечують потужний гепатопротекторний ефект і значно посилюють дренажну функцію печінки, обумовлюючи тим самим виведення з жовчю токсичних продуктів метаболізму і екзогенних токсинів.
- Холеретичний і холекінетичний ефекти екстрактів лікарських рослин, що містяться в препараті, призводять до зменшення в'язкості жовчі і зниження її літогенності, що створює умови для зворотного розвитку дрібних конкрементів жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.

Показання

Збагачені фосфоліпіди, силімарин і альфа-ліпоева кислота, що входять до складу препарату, застосовуються:

- для профілактики токсичних впливів на печінку, пов'язаних з тривалим застосуванням лікарських препаратів (антибіотикотерапія, хіміотерапія і т.д.), прийомом алкоголю, курінням і впливом несприятливих екологічних чинників;
- в якості супутнього кошти для нормалізації процесів травлення, обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при алергічних і шкірних захворюваннях;

- як допоміжний засіб для нормалізації процесів травлення, обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при прийомі лікарських препаратів, дія яких спрямована на зниження надлишкової маси тіла;
- в комплексній терапії хронічних гепатитів різної етіології, цирозу печінки.

Протипоказання

- індивідуальна чутливість до компонентів препарату;
- не застосовувати дітям до 8-ми років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування жінкам в період вагітності і лактації можливо тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози

Рекомендоване дозування по віковим обмеженням:

- дорослим і дітям старше 12-ти років - по 1-2 капсули три рази на день під час їжі, запити водою;
- дітям з 8-ми до 12-ти років - по 1 капсулі три рази на день під час їжі, запити водою.

Курс прийому 30-40 днів.

Перерва 2 тижні.

При необхідності курс можна повторити.

При призначенні лікаря можливе тривале застосування протягом 4-6 місяців.

Як профілактичний засіб - по 1 капсулі 2 рази на день під час їжі протягом 30-40 днів, перерва - 2 тижні (при необхідності курс можна повторити).

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції на окремі компоненти препарату.

У разі значного проміжку часу між прийомом препарату і наступним вживанням їжі можуть виникати легкі диспепсичні явища (нудота, відчуття гіркоти у роті), що проходять після початку їжі.

При застосуванні препарату в невиправдано високих дозах можливі диспептичні явища: нудота, блювота, діарея (показано симптоматичне лікування, промивання шлунка, прийом ентеросорбентів).

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 18 ° С до 25 ° С і відносній вологості повітря не більше 75%.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 капсул у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ "БУДЬТЕ ЗДОРОВІ", Україна.