

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки трави і листя полину гіркого (1 : 5) (Absinthii herba et folia) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

## **Лікарська форма**

Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина бурувато-зеленого кольору з характерним запахом. В процесі зберігання можливе випадання осаду.

## **Фармакотерапевтична група**

Засіб рослинного походження, що підвищує апетит. Гіркота (amara). Код АТХ А 15.

## **Фармакодинаміка**

Підразнює чутливі нервові закінчення смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, що рефлексорним шляхом викликає підсилення секреції шлункового соку, підвищення апетиту, покращення процесу травлення.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

Гіпоацидний і анацидний гастрит, анорексія – у складі комплексної терапії.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, жовчнокам'яна хвороба, рефлюкс-езофагіт, епілепсія. Вагітність. Дитячий вік до 12 років. Наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза, анемія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не виявлена.

## **Особливості застосування**

Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування даного лікарського засобу, чи спостерігаються будь-які побічні реакції.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Оскільки до складу лікарського засобу входить етанол, він може впливати на здатність керувати автотранспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами, тому на період лікування лікарським засобом слід утриматися від роботи з потенційно небезпечними механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

Приймають внутрішньо по 15–20 крапель 3 рази на добу за 15–30 хв до прийому їжі. Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту.

## **Діти**

Не слід застосовувати дітям віком до 12 років. Дітям віком від 12 років лікарський засіб застосовують за призначенням лікаря.

## **Передозування**

Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій, втрати свідомості.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори.

*Лікування:* симптоматичне.

## **Побічні реакції**

Тривале застосування настойки полину може викликати так звану полинну епілепсію, прийом в підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та ін.

Нудота, блювання, реакції підвищеної чутливості (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж).

Абсинтин, що міститься у полині, при тривалому вживанні може спричинити атонію кишок. *При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.*

### **Термін придатності**

5 років.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 25 мл у флаконах-крапельницях.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «Тернофарм».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4