

## **Склад**

*діюча речовина:* звіробою трава( *Hyperici herba* );

*1 фільтр-пакет* містить звіробою трави( *Hyperici herba* )1,5 г.

## **Лікарська форма**

Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки стебел, листків, квіток різної форми та недозрілих плодів, зеленувато-жовтого, зеленого, сірувато-зеленого, темно-зеленого, зеленувато-коричневого, яскраво-жовтого або жовтого з чорними крапками, іноді рожево-фіолетового кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01А D11.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять в'язучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин; помірно впливають на жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію.

## **Показання**

У складі комплексної терапії захворювань жовчовивідних шляхів (дискінезій жовчовивідних шляхів, холециститів); шлунково-кишкового тракту (гострих і хронічних колітів, діареї, метеоризму, гіпоацидного гастриту).

При запальних процесах ротової порожнини (гінгівітах, стоматитах).

## **Протипоказання**

Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.  
Артеріальна гіпертензія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідні, протизаплідні, гіпотензивні-блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (статини), серцеві глікозиди.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Застосування препарату у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказане внутрішнє застосування препарату.

### **Спосіб застосування та дози**

1,5 столової ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років - по  $\frac{1}{3}$  склянки, дітям віком 12-14 років - по 1-2 столових ложки, дітям віком 15-16 років - по  $\frac{1}{4}$  склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15 хв. Застосовувати у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років - по  $\frac{1}{2}$  - 1 склянці, дітям віком 12-14 років - по  $\frac{1}{4}$  склянки, діти віком 15-16 років - по  $\frac{1}{2}$ -  $\frac{1}{4}$  склянки.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### **Діти**

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

### **Передозування**

Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.

### **Побічні реакції**

Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (гіперемія, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-випромінювання).

### **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.