

Склад

діюча речовина: звіробою трава(*Hyperici herba*);

1 фільтр-пакет містить звіробою трави(*Hyperici herba*)1,5 г.

Лікарська форма

Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки стебел, листків, квіток різної форми та недозрілих плодів, зеленувато-жовтого, зеленого, сірувато-зеленого, темно-зеленого, зеленувато-коричневого, яскраво-жовтого або жовтого з чорними крапками, іноді рожево-фіолетового кольору.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм.Засоби для застосування у стоматології. Код АТС A01A D11.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять в'яжучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин; помірно впливають на жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію.

Показання

У складі комплексної терапії захворювань жовчовивідних шляхів (дискінезій жовчовивідних шляхів, холециститів); шлунково-кишкового тракту (гострих і хронічних колітів, діареї, метеоризму, гіпоацидного гастриту).

При запальних процесах ротової порожнини (гінгівітах, стоматитах).

Протипоказання

Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.
Артеріальна гіпертензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідні, протизаплідні, гіпотензивні-блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (стати́ни), серцеві глікозиди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування препарату у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказане внутрішнє застосування препарату.

Спосіб застосування та дози

1,5 столової ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років - по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком 12-14 років - по 1-2 столових ложки, дітям віком 15-16 років - по $\frac{1}{4}$ склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років - по $\frac{1}{2}$ - 1 склянці, дітям віком 12-14 років - по $\frac{1}{4}$ склянки, діти віком 15-16 років - по $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ склянки.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування

Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.

Побічні реакції

Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (гіперемія, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-випромінювання).

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.