

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить порошки: корені каперців трав'янистих (*Capparis spinosa*) – 65 мг; насіння цикорію дикого (*Cichorium intybus*) – 65 мг; пасльону чорного (*Solanum nigrum*) – 32 мг; касії західної (*Cassia occidentalis*) – 16 мг; кори терміналії аржуни (*Terminalia arjuna*) – 32 мг; тамариксу кальського (*Tamarix gallica*) – 16 мг; насіння деревію звичайного (*Achillea millefolium*) – 16 мг; заліза оксиду (*Mandur bhasma*) – 33 мг; які оброблені водним екстрактом з: екліпти білої (*Eclipta alba*), філантусу гіркого (*Phyllanthus amarus*), коріння берхавії розлогої (*Boerhaavia diffusa*), стебел тіноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*), коренеплодів редьки посівної (*Raphanus sativus*), плодів ембліки лікарської (*Emblica officinalis*), кореневища свинчатки цейлонської (*Plumbago zeylanica*), насіння ямбелі смородинової (*Embelia ribes*), плодів міраболанового дерева (*Terminalia chebula*), рутки лікарської (*Fumaria officinalis*);

*допоміжні речовини:* магнію стеарат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, натрію карбоксиметилцелюлоза, кремнію діоксид колоїдний безводний.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі, двоопуклі таблетки зеленувато-сірого кольору із світлими та темними вкрапленнями.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовують при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.

Код АТХ А05.

## **Фармакодинаміка**

Комбінований рослинний гепатопротекторний засіб. Захищає паренхіму печінки від дії токсичних агентів. Гепатопротекторна дія препарату обумовлена антиоксидантними і мембраностабілізуючими властивостями компонентів, що входять до його складу. Препарат підвищує рівень ендогенних токоферолів у гепатоцитах і рівень цитохрому Р450. Лів.52 стимулює біосинтез білків і фосфоліпідів. Сприяє відбудові гепатоцитів, зменшує дегенеративні, жирові і фіброзні зміни, посилює внутрішньоклітинний обмін.

Лікарський засіб регулює рівень плазмових білків крові, нормалізує співвідношення альбумін/глобулін. Забезпечує нормалізацію рівня плазмових трансаміназ, холестерину, тригліцеридів, зменшуючи прояви дисліпідемії. Знижує показники білірубину і лужної фосфатази. Підвищує здатність печінки до депонування глікогену.

Покращує колоїдні властивості жовчі, попереджає утворення жовчних каменів. Покращує скоротливу функцію жовчного міхура. Покращує процеси травлення і засвоєння їжі. Стимулює гемопоез.

При алкогольному ураженні печінки препарат знижує рівень етанолу в крові і сечі; підвищує активність ацетальдегіддегідрогенази, що сприяє зниженню рівня ацетальдегіду; запобігає зв'язуванню ацетальдегіду з білками клітини, прискорює його виведення.

## **Показання**

Комплексне лікування та профілактика хронічних дифузних захворювань печінки, алкогольного ураження печінки, радіоактивних та хіміотерапевтичних уражень печінки. Як засіб для підвищення стійкості організму при гепатотоксичних ураженнях, для прискорення одужання в період реконвалесценції після тяжких захворювань, перенесених операцій. Холецистоангіохоліти та дискінезії жовчовивідних шляхів.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу та до інших рослин родини Айстрових (Складноцвіті). Жовчнокам'яна хвороба. Гострі запальні захворювання шлунка та кишечника. Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При одночасному застосуванні Лів.52 та ібупрофену рівень останнього в організмі зменшується внаслідок затримки абсорбції. При застосуванні одночасно з тетрацикліном або доксицикліном зменшується біодоступність антибіотиків.

## **Особливості застосування**

Є повідомлення про розвиток епідермального некролізу у хворих на хронічний і гострий інфекційний гепатит, які приймали Лів.52.

При гострому інфекційному гепатиті препарат застосовують за призначенням лікаря з обережністю.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

### **Спосіб застосування та дози**

Таблетки Лів.52 приймають усередину.

*Дорослим і дітям віком від 14 років* призначають по 2 таблетки 3 рази на добу.

*Дітям віком від 6 до 14 років* призначають по 1 таблетці 3 рази на добу.

Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

При алкогольному ураженні печінки дорослим призначають по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 1 місяця, потім по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 6 – 12 місяців.

### **Діти**

Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 6 років не встановлена, тому протипоказано його призначати цій віковій категорії пацієнтів.

### **Передозування**

Випадків передозування не спостерігалось. Можливе запаморочення чи посилення проявів побічних реакцій. Специфічний антидот відсутній. Лікування симптоматичне.

### **Побічні реакції**

*З боку шкіри та підшкірної клітковини:* гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, тяжкі шкірні реакції, в т. ч. токсичний епідермальний некроліз.

*З боку травного тракту:* диспептичні явища, нудота, послаблення випорожнення.

При застосуванні лікарського засобу можливі реакції гіперчутливості.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 100 таблеток у пластиковій банці, по 1 банці в картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Хімалая Драг Компані.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Макалі, Бангалор – 562 162 , Індія.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).