

Склад

Склад: (в 1 мл): лактаза – 0,6 г, калію хлорид – 0,00932 г, гліцерин – 0,25 мл, вода очищена – до 1 мл. 1 мл розчину крапель містить 3000 ALU лактази.

Опис

Дієтична добавка, яка може бути рекомендована лікарем, як додаткове джерело ферменту лактази, для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму дитини. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Прийом ферменту лактази допомагає засвоєнню молока, усуває коліки та здуття. Дозволяє зберегти грудне вигодовування і усунути причини кольок.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Спосіб застосування та дози

Добова потреба у продукті індивідуальна та залежить від віку, маси тіла та стану здоров'я немовляти (від народження). Добова доза продукту визначається і контролюється лікарем.

Інструкція з приготування

<i>Вік</i>	<i>Кількість молока за один прийом їжі</i>	<i>Кількість крапель за один прийом їжі</i>	<i>Кількість лактази за один прийом їжі</i>
0-2 тижні	60-90 мл	5 крапель	750 ALU
3-4 тижні	120 мл	6 крапель	900 ALU
1-2 місяці	150 мл	8 крапель	1200 ALU
3-4 місяці	180 мл	9 крапель	1350 ALU
5 місяців-3 роки	200 мл	10 крапель	1500 ALU
Для жінок, які годують немовлят груддю	200 мл	10 крапель	1500 ALU

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та захищеному від впливу сонячного світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Строк придатності добавки після першого відкриття контейнера не більше ніж 3 тижні.

Упаковка

Краплі оральні - 15 мл в скляному контейнері з пробкою-крапельницею, закриті пластиковою кришкою. З 15 мл можна приготувати 37 порцій (доз) з рекомендованою дозою 8 крапель на кожную порцію.

Виробник

Спільне українсько-іспанське підприємство «Сперко Україна».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.