

Склад

Клітковина рослинна або порошок пектину, глюкоза, стеарат магнію, ліофільно висушена біомаса лактобактерій: *Lactobac. Rhamnosus* LB $5,0 \times 10^9$ КУО і *Lactobac. Murinus* LNS $2,5 \times 10^8$ КУО.

Властивості

Може сприятливо впливати на нормалізацію роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення евакуаторної функції кишечника та запобігання дисбактеріозу.

Компоненти «Йогурт Norm» можуть сприяти нормалізації роботи системи травлення та поступовому відновленню балансу мікрофлори кишечника. «Йогурт Norm» спеціально розроблений для допомоги в профілактиці дисбактеріозу та захисту системи травлення в ситуаціях, пов'язаних з підвищеним ризиком кишкових проблем, у тому числі при зміні раціону харчування, переїздах і подорожах.

Ефективність «Йогурт Norm» зумовлена поєднанням компонентів:

- унікальних штамів лактобактерій: *L. Rhamnosus* LB, *L. Murinus* LNS (пробіотика);
- клітковини рослинної (пектину (пребіотику)).
- Лактобактерії забезпечують нормальне вторинне травлення та відновлення мікрофлори в усіх відділах травного тракту. Комбінація штамів *L. Rhamnosus* LB та *L. Murinus* LNS має виражену антагоністичну активність проти патогенних (гнильних) мікроорганізмів і збудників гострих кишкових інфекцій. Це пов'язано зі здатністю лактобактерій утворювати молочну кислоту, перекис водню, лізоцим та інші речовини з протимікробною дією до широкого спектру грамположитивних і грампегативних бактерій. Імуномодулююча функція лактобактерій виявляється у здатності підвищувати загальний рівень секреторного імуноглобуліну А і титри специфічних секреторних антитіл, підсилувати фагоцитоз.

Клітковина рослинна (пектин) адсорбує токсичні речовини і захищає стінки кишечника від подразнення. Очищує ворсинки тонкої кишки, покращує засвоєння біологічно активних речовин.

Рекомендації щодо застосування

Сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту та покращенню евакуаторної функції кишечника; запобігає виникненню дисбактеріозу. Не

містить ГМО. Додатки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1-2 капсули двічі на день за 10 хвилин до прийому їжі. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Тривалість прийому 15 днів. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні, жінки-годувальниці; діти до 12 років.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -10 °C до +25 °C.