

Опис

Одна доза містить: не менше 10^7 живих біфідобактерій.

Допоміжні речовини: сахароза - від 7 до 10%, желатин харчовий - від 0,7 до 1,0%, молоко знежирене - від 15 до 25%.

Рекомендації щодо застосування

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту

- для лікування при тривалих кишкових дисфункціях невстановленої етіології;
- при гострих кишкових інфекціях (в комплексному лікуванні дизентерії, сальмонельозу, ешеріхіозу, вірусних діарей), при тривалих кишкових дисфункціях стафілокової етіології, а також для лікування реконвалесцентів після гострих кишкових інфекцій при тривалій дисфункції кишечника;
- в комплексному лікуванні дітей (в тому числі новонароджених, недоношених), хворих на пневмонію, сепсис та інші гнійно-інфекційні хвороби, для профілактики розладів функції кишечника та запобігання розвитку виразково-некротичного ентероколіту;
- показаний дітям з обтяженим преморбідним станом: народилися передчасно або з ознаками недоношеності, які приймають антибіотики в ранньому неонатальному періоді; у дітей, матері яких мали важкі токсикози, екстрагенітальні хвороби, тривалий безводний період та іншу патологію; у дітей, матері яких мають лактостаз, тріщини сосків і відновлюють годування грудьми після одужання від маститу; у ослаблених дітей з анемією, гіпотрофією, рахітом, діатезом та іншими проявами алергії при захворюванні на кашлюк, особливо при наявності у них будь-яких порушень функції кишечника;
- при кишкових дисфункціях як наслідок дисбактеріозу кишечника, що виник після тривалої антибактеріальної, гормональної, променевої та інших видів терапії, стресові ситуації і перебування в екстремальних умовах, а також з метою профілактики зазначеної патології;
- через складну епідситуацію в пологових будинках з метою профілактики маститу для місцевої обробки молочних залоз матерів-годувальниць групи "ризик" (у жінок з втягнутим плоским соском, зниженням його ерекції, наявністю тріщин).

При захворюваннях жіночої статеві сфери:

- при порушенні чистоти вагінального секрету до III-IV ступеня у вагітних групи "ризик",
- при бактеріальних кольпітах, викликаних стафілококом та кишковою паличкою (у монофлора і в асоціаціях), а також при сенільних кольпітах гормональної природи.

Спосіб застосування

У флакон додають 1-2 чайні ложки кип'яченої води кімнатної температури і збовтують.

Рекомендоване дозування:

- дітям з 3-х до 12-ти років - по одному флакону 2 рази на добу за 30-40 хвилин до прийому їжі;
- дорослим і дітям старше 12-ти років - по 2 флакона 2-3 рази на добу за 30-40 хвилин до прийому їжі.

Рекомендований термін вживання - 20 днів. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.

Не є лікарським засобом

Протипоказання

Діти до 3-х років, вагітність, період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника в сухому, чистому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8 ° С.

Термін придатності

12 місяців від дати виготовлення.