

Склад

Активні компоненти: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis – не менше ніж $1,0 \times 10^9$ КУО/р.

Рекомендації щодо застосування

- Вагітним при алергічних захворюваннях та у разі, коли у батька майбутньої дитини є в анамнезі алергічні захворювання;
- Дорослим та дітям з перших днів життя, у яких є алергічні захворювання;
- Дорослим та дітям при дисбіозі кишечника;
- Дітям для підтримки імунітету та при лактозній недостатності;
- Вагітним, які проживають у несприятливих екологічних умовах, при порушенні дієти, наявності хронічних захворювань, під час антибіотикотерапії, при функціональних порушеннях травлення (у тому числі при запорі);
- Недоношеним немовлятам;
- Немовлятам, які отримують штучне вигодовування та народженим шляхом кесаревого розтину.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Спосіб застосування та дози

Принимать детям от рождения до 1 года по 1,5 г/день, взрослым и детям старше 1-го года по 1,5–3 г/день. Содержимое саше растворить в 10–50 мл кипяченой питьевой воды или молока комнатной температуры, тщательно перемешать до создания однородной суспензии, оставить на 10 минут. Курс индивидуальный, определяется врачом. В случае необходимости прием повторить. Перед использованием рекомендуется консультация врача. Желательно употреблять во время еды.

Упаковка

Порошок для оральной суспензии в саше №14.

Виробник

"ProPharma", Україна.

Разработчик технологии и поставщик ингредиентов Winclove Bio Industries B.V.,
Hulstweg 11, 1032 LB Amsterdam, Нидерланды.