

## **Склад**

*діюча речовина:* льону насіння (Lini semina);

1 пачка містить: льону насіння (Lini semina) 200 г.

## **Лікарська форма**

Насіння.

*Основні фізико-хімічні властивості:* насіння сплюснуте, яйцеподібної форми, загострене з одного кінця і округле з іншого, нерівнобоке; поверхня насіння гладенька, блискуча; колір від світло-жовтого до темно-коричневого.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби для лікування кислотозалежних захворювань. Код АТХ А02Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

## **Показання**

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

## **Діти**

Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

## **Передозування**

При передозуванні можлива діарея.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції, при тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 200 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.