

Склад

Біологічно активні речовини, що містяться в 1 таблетці:

- масляна кислота - 250 mg (мг),
- інουλін - 100 mg (мг),
- Bifidobacterium lactis - 800 млн. CFU (КҮО) *
- Bifidobacterium bifidus - 220 млн. CFU (КҮО) *
- вітамін D3 - 600 МО.
- * Сумарно $1,02 \times 10^9$ CFU (КҮО)

Склад: наповнювач (мікрокристалічна целюлоза), бутират кальцію (джерело масляної кислоти), наповнювач (гідроксипропілметилцелюлоза), інουλін (фруктоолігосахаріди), наповнювачі (модифікований кукурудзяний крохмаль, тальк), вологоутримуючий агент (гліцерин), барвники (патентований синій, діоксид титану), наповнювач (магнію стеарат), холекальциферол (вітамін D3), Bifidobacterium bifidus, Bifidobacterium lactis, глазуруючий агент (полівінілпіролідон), регулятор кислотності (лимонна кислота). Без ГМО.

Властивості

Масляна кислота відноситься до жирних кислот з коротким ланцюгом, яка є продуктом життєдіяльності мікроорганізмів нормальної мікрофлори кишечни-ка людини і має такі властивості:

- забезпечує енергією клітини слизової оболонки кишечника; покращує захисний бар'єр слизової оболонки кишечника від патогенних мікроорганізмів і токсинів за рахунок: стимуляції синтезу муцина (особливого захисного бар'єру) і продукції антимікробних речовин, зміцненню зв'язків між клітинами слизової оболонки кишечника; - регулює нормальний розвиток клітин слизової оболонки кишечника;
- регулює моторику кишечника;
- має протизапальну дію;
- регулює процеси всмоктування і виділення води та електролітів у кишечнику;
- знижує підвищену чутливість кишечника до зовнішніх подразників і зменшує неприємні відчуття в кишечнику; - покращує стан нормальної мікрофлори кишечника.

Інулін - фруктоолігосахаріди (складний вуглевод рослинного походження), який відноситься до гру-пи пребіотиків і під дією нормальної мікрофлори кишечника ферментує з утворенням ендогенної масляної кислоти. Має такі властивості:

- сприяє відновленню нормальної мікрофлори кишечника і придушення патогенних мікроорганізмів;
- регулює моторику кишечника;
- сприяє засвоєнню вітамінів і мікроелементів (кальцію, магнію та інших)
- покращує вуглеводний і жировий обмін речовин в організмі (зниження глюкози крові, тригліцеридів і холестерину)
- покращує детоксикаційну, секреторну, екскреторну та імунну функції шлунково-кишкового тракту.

Біфідобактерії є необхідною складовою нормальної мікрофлори кишечника і сприяють:

- підтримці і нормалізації мікробіоценозу кишечника;
захисту від патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів за рахунок:
високого ступеня прикріплення до слизової оболонки кішечника,
антагоністичної активності по відношенню до патогенної та умовно-патогенної флори, продукції органічних кислот (молочної, оцтової!)
- зниження рівня рН в кишечнику, зменшення проникності слизової оболонки кишечника для патогенів, токсинів і алергенів, збільшення швидкості відновлення слизової оболонки;
- нормалізації травлення і моторики кишечника;
- синтезу вітамінів групи В, вітаміну К, фолієвої та нікотинової кислот;
- засвоєнню кальцію і вітаміну D;
піддержанню імунітету.

Вітамін D₃ (холекальциферол) є жиророзчинним вітаміном, який виконує наступні функції:

- підтримує необхідні рівні кальцію та фосфору в крові для формування кісток і збереження їх будови;
- регулює м'язовий тонус;
- сприяє збереженню та відновленню цілісності епітеліального бар'єру слизової оболонки кишечника;
- бере участь в регуляції імунної активності організму;
- регулює нормальний розвиток клітин слизової оболонки кишечника.

З огляду на вищевказані властивості компонентів і спеціальну технологію їх запрограмованого вивільнення в кишечнику, Зафакол®3D може бути рекомендований як додатковий засіб при:

- функціональних порушеннях роботи кишечника;
- запальних явищах в слизовій оболонці кишечника;

- порушення мікробіоцинозу кишечника в результаті прийому антибіотиків, на тлі вікових змін, соматичних і інфекційних захворювань, фізичних навантажень, впливу негативних екологічних, кліматичних, стресових і соціальних факторів.

Показання

Дієтична добавка до раціону харчування - додаткове джерело масляної кислоти, вітаміну D3, інуліну і біфідобактерій. Завдяки комплексній дії складових, Зафакол® 3D сприяє: нормальному функціонуванню клітин слизової оболонки товстого кишечника, усунення дискомфорту в області кишечника, регуляції стільця і поліпшенню якості життя (психо-емоційного стану) людини, підтримці нормального балансу і оптимізації якісного складу кишкової мікрофлори.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, діти до 12 років, Цей продукт не призначений для діагностики та лікування будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінного раціону харчування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування в період вагітності та годування груддю вимагає консультації лікаря.

Спосіб застосування та дози

Приймати дорослим і дітям з 12 років по 1-2 таблетки в день, після їди, не розжовуючи, запиваючи питною водою. Рекомендована тривалість застосування - 30 днів. Подальше споживання визначається лікарем індивідуально.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем!

Не є лікарським засобом.

Діти

Застосовувати дітям з 12 років.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва. Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці або при порушенні цілісності упаковки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, віддаленому від світла і тепла місці при температурі від 15 ° C до 25 ° C в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Альпіфлор SRL, Via Донаторов ді Санг н. 9, 12026 Піаско (CH), Італія / Alpiflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Italy. Імпортер в Україні (здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів) ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна, 03142, м.Київ, вул. Академіка Кржижановського, д. 4.