

Склад

1 таблетка масою 1000 мг (mg):

діючі інгредієнти: пробіотик *Streptococcus salivarius* K 12 (не менше 1 млрд колонієутворюючих одиниць);

допоміжні речовини: мальтодекстрин, діоксид кремніюЮ підсоложувач (фруктоза), ароматизатор (полуниця).

Характеристика

Бактобліс містить в складі пробіотик *Streptococcus salivarius* BLIS K 12 відновлює бактеріальний баланс ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів за рахунок йлго швидкої колонізації, на 3-ю добу. Унікальна та рідкісна властивість штамму *Streptococcus salivarius* BLIS K 12 одночасно вивільнення 2 бактеріоцинів (саліваріцін А2, саліваріцін В), які належать до класу лантибіотиків - агентів, що обмежують ріст численних видів пагенних бактерій, таких як: *Streptococcus pyogenes*, *Haemophilus influenza*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Micrococcus luteus*, *Streptococcus anginosus*, *Eubacterium saburreum*, *Micromonas micros* та ін. - є встановленою.

Показання

Як додаткове джерело пробіотику *Streptococcus salivarius* BLIS K12 з метою створення оптимальних умов для підтримки нормального мікробіоценозу мікрофлори, стійкості організму (резистентності) до інфекцій верхніх дихальних шляхів в період сезонних захворювань, попередження бактеріальних та вірусних захворювань, після курсу антибіотиків з метою відновлення природньої мікрофлори слизової ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів. Не перевищувати рекомендовану добову норму. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям від 3х років рекомендовано розсмоктувати по 1 таблетці на добу у ротовій порожнині до повного розчинення, бажано у вечірній час перед сном, після чистки зубів. Для дітей, які не можуть розсмоктувати, слід подрібнити таблетку. до порошкоподібної форми та нанести на ясна в тій же дозі,

не запиваючи рідиною.

Після застосування не рекомендовано споживати їжу або воду протягом 30 хвилин.

Термін застосування: від 10 днів. Курс застосування більше 90 днів має бути узгоджений з лікарем.

Для попередження бактеріальних захворювань ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів: по 1 таблетці на добу протягом 30 днів.

Для усунення неприємного запаху з рота: по 1 таблетці на добу протягом 10-15 днів.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Транспортувати можливо при температурі яка не перевищує 25 °С протягом не більше 48 годин.

Упаковка

1 блістер по 10 таблеток, в картонній упаковці.

Виробник

Medico domus s.o.o., Сербія (виробничі потужності).

Bluestone Pharma, Швейцарія.