

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки м'яти перцевої (*Menthae piperitae folium*) (1 : 20) (екстрагент – етанол 90 %) 25 мл;

*допоміжна речовина:* олія м'яти перцевої.

## **Лікарська форма**

Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина від зеленого до зелено-бурого кольору, з запахом м'яти перцевої. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

## **Фармакотерапевтична група**

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинаміка**

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться у листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлексним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не виявлена.

### **Особливості застосування**

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Слід мати на увазі, що до складу препарату входить спирт етиловий, тому слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

М'яти перцевої настоянка містить спирт етиловий, тому препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат приймати внутрішньо до їди. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 10–15 крапель настоянки 3–4 рази на день.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

### **Діти**

Не рекомендується застосовувати «М'яти перцевої настоянку» дітям до 12 років через вміст спирту етилового, що входить до складу препарату.

### **Передозування**

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності**

3 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 мл у флаконі.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).