

Склад

діюча речовина: подорожника великого листа (*Plantaginis majoris folia*);

1 пачка містить подорожника великого листа (*Plantaginis majoris folia*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить подорожника великого листа (*Plantaginis majoris folia*) 1,5 г.

Лікарська форма

Листя.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя різної форми зеленого, коричнево-зеленого кольору.

Фармакотерапевтична група

Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, знеболювальну, кровоспинну, ранозагоювальну, бактеріостатичну дію; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють виділенню і евакуації слизу з них, зменшують кашель; посилюють секрецію шлункового соку, підвищують кислотність; сприяють очищенню ранових та виразкових поверхонь від гноєтворних бактерій, посилюють процеси грануляції поверхонь уражених тканин.

Показання

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, коклюш, пневмосклероз, туберкульоз легенів), шлунково-кишкові захворювання (гастрити та виразкова хвороба шлунка зі зниженою кислотністю, ентерити та ентероколіти) – у складі комплексної терапії. Зовнішньо застосовувати як ранозагоювальний засіб.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гіперацидний гастрит, виразка дванадцятипалої кишки та виразкова хвороба шлунка з підвищеною кислотністю; підвищене згортання крові та схильність до

тромбоутворення, рефлюкс-езофагіт.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не застосовувати одночасно з протикашльовими препаратами та лікарськими засобами, що зменшують виділення мокротиння.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря у тому випадку, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по $\frac{1}{3}$ склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди; дітям віком 1-3 роки - по 1 чайній ложці, 2-5 років - по 1 десертній ложці, 5-10 років - по 1 столовій ложці, 10-14 років - по $\frac{1}{4}$ склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди.

3 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослим приймати у теплому вигляді по $\frac{1}{2}$ склянки 4 рази на добу за 10-15 хв до їди; дітям віком 1-3 років - по 1 десертній ложці, 3-5 років - по 2 десертні ложки, 5-10 років - по 2 столові ложки, 10-14 років - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Зовнішньо - змочувати настоєм марлеву серветку і прикладати на уражені ділянки шкіри.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 1 року.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), печія.

Термін придатності

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.