

## **Склад**

водно-спиртові екстракти листовика сколопендрового, пагонів багна, трави гірчака пташиного (спориша), материнки, фіалки, кореня солодки.

## **Лікарська форма**

Водно-спиртовий розчин. Помутніння розчину або поява осаду не свідчить про псування або втрату активності препарату.

## **Фармакодинаміка**

Клінічно підтверджено, що при застосуванні фітоконцентрату Бронхін зникає необхідність у використанні інших бронхолітичних та муколітичних препаратів. Він є ефективним комплексним протизапальним, бронхолітичним, муколітичним засобом. Фітоконцентрат посилює фізіологічну активність миготливого епітелію і моторну функцію бронхіол, сприяє просуванню мокротиння з нижніх відділів дихальних шляхів у верхні і виведенню її назовні. Ця дія поєднується з посиленням секреції бронхіальних залоз і зменшенням в'язкості мокротиння. Широкий спектр позитивних змін в бронхолегеневій системі при застосуванні Бронхіну підтверджується зростанням восьми показників функції зовнішнього дихання при хронічних бронхітах (зокрема обструктивних), бронхопневмонії затяжного характеру, бронхіальній астмі. Застосування препарату при бронхіальній астмі допомагає зменшити дозу гормональних препаратів та муколітиків, полегшити її перебіг, а в комплексі з фітоконцентратом Лізорм дозволяє часто повністю позбутися від цього захворювання.

## **Показання**

Фітоконцентрат Бронхін - функціональний продукт натурального походження, ефективний засіб проти кашлю будь-якої природи. Застосовується при:

- гострих і хронічних захворюваннях органів дихання;
- бронхіті;
- пневмонії;
- кашлевому синдромі;
- бронхіальній астмі;
- туберкульозі легень;
- бронхоектатичній хворобі;
- професійних захворювання легень.

## **Протипоказання**

Вагітні жінки, матері-годувальниці, підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Особливості застосування**

Покращує бронхіальну прохідність, є комплексним протизапальним, бронхолітичним, муколітичним засобом. При використанні Бронхіну зникає необхідність в застосуванні інших бронхолітичних та муколітичних засобів.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

*Спосіб застосування і дозування:* дорослим з метою профілактики по 30 - 50 крапель на 100 мл за 30 хвилин до або після їжі один-два рази на день. Курс-3 тижні. Повторний курс - після двотижневої перерви.

*Дозування для дітей:* 1 крапля препарату на 1 кг ваги дитини дорівнює добовій дозі, яку ділять на 2 прийоми і розводять теплою водою з розрахунку кожні 5 крапель на столову ложку води.

## **Побічні реакції**

Фітоконцентрат Бронхін добре переноситься і не має побічних дій.

Побічних ефектів при апробації Бронхіну в клініках різного профілю не було (на упаковці вказані загальні обмеження).

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в темному недоступному для дітей місці при температурі від +15 ° С до +25 ° С.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ЕКОМЕД ТОВ

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, Харківська область, Харків, 57001, вул. Бакуліна, 4