

## **Склад**

*діюча речовина:* пижма квітки.

## **Лікарська форма**

Квітки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* подрібнена сировина: цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа і їх шматочки, шматочки квітконосів; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений; порошок крупний: суміш шматочків квітколож, квітконосів, цілісних або подрібнених трубчастих квіток; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, протимікробну, протиглисну, фітонцидну, в'язучу та протизапальну дію.

## **Показання**

Аскаридоз, гострики; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (холецистити, ангіохоліти); шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, коліти, ентероколіти).

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Гепатити, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу.

Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат не застосовувати дітям.

## **Передозування**

Диспептичні розлади, блювання, в тяжких випадках – судоми.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка**

Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.