

## **Склад**

*діюча речовина:* настоянка плодів перцю стручкового (Fructus Capsici) (1:10)  
(екстрагент - етанол 90 %);

1 флакон містить настоянки плодів перцю стручкового (Fructus Capsici) (1:10)  
(екстрагент - етанол 90 %) - 50 мл.

## **Лікарська форма**

Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина жовтаво-оранжевого кольору.  
Можливе випадання осаду.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Код АТХ  
M02A B.

## **Фармакодинаміка**

Препарат чинить місцевоподразнювальну дію і при нанесенні на шкіру діє  
подібно до гірчичника.

## **Показання**

Перцю стручкового настоянку застосовувати як місцевий подразнювальний та  
відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритах, ревматизмі.

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість до будь-якого з компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно  
промивати їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з

гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не досліджена.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпеку та клінічну ефективність настоянки у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому в цей період препарат не слід застосовувати.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовувати зовнішньо. Настоянкою розтирати болючі місця 1-2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.

### **Діти**

Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не слід призначити.

### **Передозування**

Випадки передозування не спостерігалися.

### **Побічні реакції**

Препарат зазвичай добре переноситься, але в окремих випадках при індивідуальній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття печіння, почервоніння шкіри, свербіж, висипання на місці нанесення.

### **Термін придатності**

4 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 50 мл у флаконі.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).