

Склад

діючі речовини: 2,0 мл розчину містять: Acidum thiocticum D8 – 2 мг, Arnica montana D4 – 200 мг, Cartilago suis D6 – 2 мг, Coenzym A D8 – 2 мг, Embryo totalis suis D6 – 2 мг, Funiculus umbilicalis suis D6 – 2 мг, Nadidum D8 – 2 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8 – 2 мг, Placenta totalis suis D6 – 2 мг, Rhus toxicodendron D2 – 10 мг, Sanguinaria canadensis D4 – 3 мг, Solanum dulcamara D3 – 10 мг, Sulfur D6 – 3,6 мг, Symphytum officinale D6 – 10 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху і практично вільний від часток.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Препарат чинить протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну та регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Показання

Артрози (зокрема гонартрози); поліартрози, спондилоартрози, плечолопатковий періартрит.

Протипоказання

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т. ч. *Arnica*), пліска отруйного або до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Особливості щодо застосування

Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати, оскільки препарат містить компонент *Sanguinaria*.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 2 мл, дітям віком від 6 до 12 років – 1,5 мл. Застосовувати разову дозу 1–3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньовенних (струминно), внутрішньо-, навколосуглобових та паравертебральних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки. При захворюванні великих суглобів разова доза для дорослих – 4 мл. При ускладненому перебігу захворювань разову вікову дозу застосовувати 3 дні поспіль, надалі – двічі на тиждень.

Курс лікування – 2–5 тижнів.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 6 років (через відсутність клінічного досвіду).

Побічні ефекти

В окремих випадках при застосуванні препарату можливі шлунково-кишкові розлади, при індивідуальній непереносимості компонентів препарату можливі реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичну реакцію, шкірні висипання; зміни в місці введення, в т. ч. почервоніння, набряк, біль у місці ін'єкції.

Термін придатності

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

10 (5×2) ампул та 100 (5×20) ампул по 2,0 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.