

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять Calcium carbonicum 30CH 20 мг, Calcium carbonicum 1000CH 20 мг, Calcium phosphoricum 1000CH 20 мг, Calcium fluoricum 500CH 20 мг, Silicea 1000CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Код АТХ. Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням компонентів, що входять до складу препарату. Регулює мінеральний обмін, сприяє нормалізації росту і репарації кісткової тканини; зміцнює зв'язковий апарат суглобів, прискорює загоєння хірургічних ран, має протиалергічну дію; нормалізує діяльність травного тракту, сприяє нормалізації кишкової флори; має імуномодулюючу та протизапальну дію.

## **Показання**

У складі комплексної терапії: лікування і профілактика порушень фосфорно-кальцієвого обміну (рахіту, сколіозу, карієсу), особливо у періоди інтенсивного росту; профілактика системного остеопорозу в осіб з підвищеним ризиком його розвитку; у реабілітаційний період переломів кісток, операцій на кісткових тканинах, при остеомієліті; імунодефіцитні стани у дітей.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Протипоказань для комбінації з іншими фармакологічними засобами немає.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

### **Особливості застосування**

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини - крупки цукрової - хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Жінкам у період вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем, який має оцінити співвідношення користі для матері та потенційного ризику для плода/дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат призначається у комплексній терапії як додатковий засіб при порушеннях фосфорно-кальцієвого обміну – 3 рази на тиждень, курсами від 3 до 6 місяців, залежно від тяжкості стану. Після травм, операцій, для лікування остеомієліту – 3 рази на добу, протягом 10-14 днів, при переломах кісток – до утворення кісткової мозолі. Для підготовки до операції – 3 рази на добу, протягом 8-10 днів. Дорослим та дітям застосовувати по 5 гранул під язик.

### **Діти**

Препарат не призначають дітям віком до 1 року.

### **Передозування**

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

### **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

**Термін придатності**

3 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°C.

**Упаковка**

По 10 г в пеналі полімерному або флаконі з кришкою; по 1 пеналу або флакону в пачці з картону.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 76-78.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).