

## **Склад**

діючі речовини: настойка живокосту (*Tinctura Symphyti e radix*), токоферолу ацетат (вітамін Е);

100 г мазі містять настоїки живокосту (*Tinctura Symphyti e radix*) (1:5) 10 г (екстрагент: етанол 65 % (об/об)), токоферолу ацетату (вітаміну Е) 1 г;

*допоміжні речовини:* свинячий жир, антиоксидант Вітабленд АТР-СА 50, олія кукурудзяна, макрогол-30-диполігідроксистеарат, ароматизатор соснової хвої, барвник – мідний комплекс хлорофілів (Е 141).

## **Лікарська форма**

Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гладка маса світло-зеленого кольору з характерним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що застосовуються місцево при болях у суглобах і м'язах. Код АТХ М02А Х10.

## **Фармакодинаміка**

Дія лікарського засобу визначається компонентами, що входять до його складу. Основними діючими речовинами кореня живокосту є алантойн, слизові і дубильні речовини. Вони зумовлюють протизапальний, болезаспокійливий ефект, сприяють формуванню кісткової мозолі. Алантойн регенерує епітелій, зменшує болісність.

Вітамін Е посилює ефект алантойну, поліпшує живлення клітин, захищає їх від руйнування.

## **Фармакокінетика**

Фармакокінетичні дослідження не проводилися.

## **Показання**

Біль у суглобах, спині, попереку при радикулітах, остеохондрозі, артритах. Спортивні, побутові травми-забиття, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток. Сухість, поверхневі тріщини шкіри.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до активних речовин або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Через відсутність даних застосування препарату дітям та підліткам віком до 18 років протипоказано.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

## **Особливості застосування**

Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості.

Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, у тому числі носа та на зону навколо очей, на пошкоджену та подразнену шкіру, відкриті рани. Не застосовувати препарат у ділянці обличчя, не допускати потрапляння мазі в очі. Наносити винятково на неушкоджену шкіру.

Макрогол-30-диполігідроксистеарат може викликати алергічні реакції.

Якщо при застосуванні лікарського засобу симптоми зберігаються або погіршуються, необхідно проконсультуватися з лікарем.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпека застосування у період вагітності або годування груддю не встановлена. Через відсутність достатніх даних цей лікарський засіб протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим 2-3 рази на добу наносити мазь тонким шаром на болючі ділянки.

Тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання і не має перевищувати 10 днів, а в цілому 4-6 тижнів впродовж року.

### **Діти**

Застосування препарату дітям та підліткам віком до 18 років протипоказано.

### **Передозування**

Про випадки передозування не повідомлялось.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції на складові лікарського засобу (у т. ч. свербіж, набряк, пропасниця).

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 20 г або по 50 г, або по 100 г у банці скляній. По 1 банці у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/ Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України.](#)