

Склад

діючі речовини: настоянка живокосту (*Tinctura Symphyti e radix*), токоферолу ацетат (вітамін E);

100 г мазі містять настоянки живокосту (*Tinctura Symphyti e radix*) (1:5) 10 г (екстрагент: етанол 65 % (об/об)), токоферолу ацетату (вітаміну E) 1 г;

допоміжні речовини: свинячий жир, антиоксидант Вітабленд АТР-СА 50, олія кукурудзяна, макрогол-30-диполігідроксистеарат, ароматизатор соснової хвої, барвник - мідний комплекс хлорофілів (E 141).

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: гладка маса світло-зеленого кольору з характерним запахом.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються місцево при болях у суглобах і м'язах. Код АТХ M02A X10.

Фармакодинаміка

Дія лікарського засобу визначається компонентами, що входять до його складу. Основними діючими речовинами кореня живокосту є алантоїн, слизові і дубильні речовини. Вони зумовлюють протизапальний, безпечний, болезаспокійливий ефект, сприяють формуванню кісткової мозолі. Алантоїн регенерує епітелій, зменшує болісність.

Вітамін E посилює ефект алантоїну, поліпшує живлення клітин, захищає їх від руйнування.

Фармакокінетика

Фармакокінетичні дослідження не проводилися.

Показання

Біль у суглобах, спині, попереку при радикулітах, остеохондрозі, артритах. Спортивні, побутові травми-забиття, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток. Сухість, поверхневі тріщини шкіри.

Протипоказання

Підвищена чутливість до активних речовин або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Через відсутність даних застосування препарату дітям та підліткам віком до 18 років протипоказано.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості.

Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, у тому числі носа та на зону навколо очей, на пошкоджену та подразнену шкіру, відкриті рани. Не застосовувати препарат у ділянці обличчя, не допускати потрапляння мазі в очі. Наносити винятково на неушкоджену шкіру.

Макрогол-30-диполігідроксистеарат може викликати алергічні реакції.

Якщо при застосуванні лікарського засобу симптоми зберігаються або погіршуються, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Невідома.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпека застосування у період вагітності або годування груддю не встановлена. Через відсутність достатніх даних цей лікарський засіб протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Дорослим 2–3 рази на добу наносити мазь тонким шаром на болючі ділянки.

Тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання і не має перевищувати 10 днів, а в цілому 4–6 тижнів впродовж року.

Діти

Застосування препарату дітям та підліткам віком до 18 років протипоказано.

Передозування

Про випадки передозування не повідомлялось.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції на складові лікарського засобу (у т. ч. свербіж, набряк, пропасниця).

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 г або по 50 г, або по 100 г у банці скляній. По 1 банці у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/ Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).