

## **Склад**

*діючі речовини:* 100 мл розчину містить бензокаїну 1 г, прокаїну гідрохлориду 1 г, ментолу рацемічного 2,5 г.

*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ M02A X.

## **Фармакодинаміка**

Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

## **Фармакокінетика**

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного русла.

## **Показання**

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

## **Протипоказання**

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших складових компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Компоненти препарату (новокаїн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### **Особливості застосування**

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирають Меновазином 2–3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

### **Діти**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

### **Передозування**

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів препарат слід відмінити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербіжжю, висипи, набряк, кропив'янка).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

## **Термін придатності**

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 40 мл у флаконах або у флаконах з механічними розпилювачами, у пачці або без пачки.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «Тернофарм».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).