

Склад

1 г лініменту містить діючі речовини: соку листа алое деревовидного свіжого (*Aloe arborescens* Mill.) – 478 мг, екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток (*Matricariae flos*) – 200 мг, екстракту рідкого (1:1) нагідок (календули) квіток (*Calendulae flos*) – 100 мг, левоментолу – 1 мг, евкаліптової олії – 1 мг;

допоміжні речовини: олія рицинова, емульгатор № 1;

допоміжні речовини, що входять до складу соку листа алое деревовидного свіжого: етанол (96%), хлорбутанол, гемігідрат; до складу екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток та екстракту рідкого (1:1) нагідок (календули) квіток: етанол (96%), вода очищена.

допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору №1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.

Лікарська форма

Лінімент.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідна густа маса від світло-коричневого до коричневого з зеленуватим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах та м'язах. Код АТС M02A X10.

Фармакодинаміка

Алором – комбінований препарат, виявляє протизапальний та знеболювальний ефект, покращує трофічні процеси, пов'язані з комплексним впливом фізіологічно активних речовин рослин, що входять до його складу (флавоноїди, дубильні речовини, антрахіноїни тощо). Препарат сприяє репарації тканин, розсмоктуванню гематом.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Показання

У складі комплексної терапії при лікуванні посттравматичних артритів, плекситів, радикулітів, поліартритів, міозитів, тендовагінітів, зовнішніх гематом,

при міалгіях; для профілактики пролежнів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату, до рослин родини складноцвітних. Вагітність. Дитячий вік до 6 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

Особливості застосування

Лінімент не можна наносити на відкриті рани та ушкоджену шкіру. Для посилення терапевтичного ефекту рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Невідома.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю препарат не застосовують.

Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком старше 6 років. Лінімент наносять тонким шаром на шкіру 2-3 рази на добу, злегка масажуючи уражені місця. Площа нанесення залежить від розміру та локалізації осередку ураження. Курс лікування становить від 5 до 15 днів. У разі необхідності курс лікування повторюють через 1-2 тижні після консультації з лікарем.

Діти

Не рекомендується застосовувати дітям до 6 років.

Передозування

При передозуванні можливе посилення побічної дії. Терапія – симптоматична.

Побічні реакції

В окремих випадках можливі алергічні реакції у вигляді подразнення шкіри, висипань, свербіж, контактний дерматит.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 0С до 15 0С. Не допускається заморожування.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Після розкриття туби лінімент зберігати протягом курсу лікування

Упаковка

По 30 г у тубах №1.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).