

## **Склад**

*діючі речовини:*

1,1 мл розчину містять: Sulfur D4 – 3,3 мкл, Sulfur D10 – 3,3 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D6 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D10 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D30 – 6,6 мкл;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

## **Лікарська форма**

Розчин для ін'єкцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Лікарський засіб чинить імунокоригуючу (непряму протівірусну), протизапальну, дезінтоксикаційну дію, регенерує SH-групи ферментів при інтоксикаціях, за рахунок активації захисних сил організму та нормалізації його функцій.

## **Фармакокінетика**

Для гомеопатичних препаратів не визначається.

## **Показання**

Гострі та хронічні інфекційні захворювання вірусного походження (гепатит, цитомегаловірусна інфекція, герпес, бронхіт, пневмонія, коклюш, грип, ГРВІ).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Випадки негативного впливу невідомі. Можливість застосування визначає лікар у випадку, якщо користь від застосування лікарського засобу переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 1,1 мл.  
Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій.

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування: 2-5 тижнів.

Тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.

## **Діти**

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

## **Передозування**

Не відзначалося.

## **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можуть виникати висипи на шкірі, свербіж, кропив'янка, еритема, сухість шкіри. У такому випадку необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. Також можливі алергічні реакції, ангіоневротичний набряк, зміни в місці введення, у тому числі почервоніння, набряки.

## **Термін придатності**

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

## **Упаковка**

5 (5 × 1), 10 (5 × 2) або 100 (5 × 20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

За рецептом.

## **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).