

## **Склад**

*діючі речовини:* 1,1 мл розчину містять: Apis mellifica D10 – 1,1 мг, Apis mellifica D30 – 1,1 мг, Apis mellifica D200 – 1,1 мг, Cimicifuga racemosa D200 – 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D30 – 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D10 – 2,2 мг, Hydrargyrum bichloratum D200 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D10 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D30 – 1,1 мг, Lachesis D10 – 1,1 мг, Lachesis D30 – 1,1 мг, Lachesis D200 – 1,1 мг, Lachesis D1000 – 1,1 мг, Liliium lancifolium D30 – 1,1 мг, Liliium lancifolium D200 – 1,1 мг, Liliium lancifolium D10 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D30 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D10 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D1000 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D200 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D200 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D1000 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D10 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D30 – 1,65 мг, Vespa crabro D10 – 1,65 мг, Vespa crabro D30 – 1,65 мг, Vespa crabro D200 – 1,65 мг;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

## **Лікарська форма**

Розчин для ін'єкцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Лікарський засіб чинить протизапальну, антиексудативну, дезінтоксикаційну, імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

## **Фармакокінетика**

Для гомеопатичних препаратів не визначається.

## **Показання**

Аднексит; параметрит, ендометрит; вагініт; дисменорея; міжменструальний біль; клімактеричний невроз.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Якщо симптоми захворювання не зникають або стан пацієнта погіршується необхідно проконсультуватися з лікарем. Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Невідома.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Випадки негативного впливу невідомі.

## **Спосіб застосування та дози**

Разова доза: дорослим і дівчатам пубертатного віку – 1 ампула по 1,1 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки), внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій 1-3 рази на тиждень.

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

## **Діти**

Лікарський засіб рекомендований для застосування, починаючи з періоду статевого дозрівання.

## **Передозування**

Не відзначалося.

## **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можуть виникати алергічні реакції, реакції у місці введення або підвищене слиновиділення внаслідок індивідуальної чутливості до гомеопатичної діючої речовини Hydrargyrum bichloratum (ртуть) – у такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

## **Упаковка**

5 ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

За рецептом.

## **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).