

## **Склад**

*діючі речовини:* 2,2 мл розчину містять: Argentum nitricum D12 - 22 мг, Carbo vegetabilis D10 - 22 мг, Ceanothus americanus D6 - 22 мг, Iodum D8 - 22 мг, Lachesis D10 - 22 мг, Lycopodium clavatum D6 - 22 мг, Mandragora e radice siccata D8 - 22 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 - 22 мг, Momordica balsamina D6 - 22 мг, Podophyllum peltatum D6 - 22 мг, Veratrum album D4 - 22 мг;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

## **Лікарська форма**

Розчин для ін'єкцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин без запаху і практично вільний від часток.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Препарат чинить протизапальну, спазмолітичну та антиексудативну дію на підшлункову залозу і завдяки цьому відновлює її функціональну активність. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

## **Показання**

Захворювання та порушення функції підшлункової залози, епігастральний синдром, регулювання антигомотоксичного ефекту при панкреатиті.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати при хворобах щитовидної залози без консультації лікаря.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

### **Особливості застосування**

При утримуванні симптомів або погіршенні стану, необхідно проконсультуватися з лікарем.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Токсичність гомеопатично розведених речовин, що входять до складу лікарського засобу, при застосуванні у період вагітності та годування груддю не встановлена.

Жодних небажаних реакцій не виявлено.

Питання щодо доцільності застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

### **Спосіб застосування та дози**

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 2,2 мл, дітям від 1 до 3 років – 0,6 мл, від 3 до 6 років – 1 мл, від 6 до 12 років – 1,5 мл. Застосовувати разову дозу 1–3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій, а також в акупунктурні точки.

Курс лікування – 2–5 тижнів.

### **Діти**

Досвід застосування дітям віком до 1 року відсутній.

### **Передозування**

Передозування не відзначалося та не очікується завдяки гомеопатичним розведенням речовин, що входять до складу даного лікарського засобу.

### **Побічні реакції**

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи алергічні реакції з боку шкіри; зміни у місці введення, у тому числі почервоніння/набряк.

### **Термін придатності**

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

5 ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

За рецептом.

### **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).