

Склад

діючі речовини: 100 г препарату містять спиртових гомеопатичних розведень: Jodum D6 – 0,1 мг, Thuja occidentalis D12 – 3 x 10⁻⁷ мг, Berberis, Fructus D4 – 20 мг, Eupatorium perfoliatum D6 – 0,3 мг;

1 г препарату містить від 41 до 55 гранул;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма

Гранули гомеопатичні.

Гранули однорідні, правильної кулястої форми, білого з сірим або кремовим відтінком кольору, без запаху, солодкі на смак.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний засіб.

Фармакодинаміка

Дія препарату зумовлена його активними компонентами. При прийомі гомеопатичної композиції припиняються супутні запальні явища з боку носо- та ротоглотки.

Препарат швидко та майже повністю всмоктується, в основному в порожнині рота і далі в шлунково-кишковому тракті, розподіляється по тканинах і рідинах організму.

Не утворює токсичних метаболітів. Не депонується у тканинах організму.

Показання

У складі комплексної терапії при аденоїдах, хронічному тонзиліті, респіраторних захворюваннях, частих застудах у дітей.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компоненту препарату. При захворюваннях щитовидної залози.

Належні заходи безпеки при застосуванні

Випадкові короткі перерви і пропуски прийомів не дуже позначаються на загальному процесі лікування.

Інформація для хворих на цукровий діабет: 1 гранула цукрова містить приблизно 0,002 хлібної одиниці.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Значних явищ несумісності з лікарськими препаратами інших груп не виявлено.

Особливості застосування

Під час приймання гомеопатичного засобу можливе тимчасове посилення наявних та таких, що спостерігалися раніше, симптомів. При цьому треба зробити перерву на 5-7 днів та проконсультуватися з лікарем. У період лікування небажані щеплення.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування препарату можливе, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода і дитини, після консультації лікаря.

Спосіб застосування та дози

Діти віком від 3 до 7 років приймають по 8-10 гранул 1 раз на день за півгодини до їди або через півгодини після їди. Препарат розсмоктують і не запивають.

Приймають 5 днів, потім

2 дні перерви.

Курс лікування не менше 2-х місяців. Можливі повторні курси після консультації з лікарем.

Діти

Препарат не застосовують дітям до 3 років.

Передозування

Відомостей щодо випадків передозування немає.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці

Упаковка

По 20 г у флаконах. 1 флакон у пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ «Біолік».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 24321, Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Леніна, 118.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).