

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) 12,5 мг;

*допоміжні речовини:* цукор, кислота аскорбінова, кальцію стеарат.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинаміка**

Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта. Препарат чинить антибактеріальну (бактеріостатичну і бактерицидну) дію щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну дію.

## **Фармакокінетика**

Не досліджена.

## **Показання**

Захворювання верхніх дихальних шляхів (тонзиліти, фарингіти, ларингіти), а також афтозні та виразкові стоматити.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до хлорофіліпту або до інших компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Посилює дію антисептичних препаратів.

## **Особливості застосування**

Перед початком застосування необхідно порадитися з лікарем.

Після першого застосування слід зробити паузу на 6-8 годин. Курсове лікування препаратом можливе після підтвердження відсутності алергічної реакції на екстракт хлорофіліпту густий (імовірність набряку губ, слизової оболонки носа, зіва та інших алергічних реакцій). Якщо з'явилися будь-які з наведених симптомів, прийом препарату необхідно припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не досліджена.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Ефективність та безпеку застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому препарат не слід застосовувати цій категорії пацієнтів.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим призначати таблетки по 12,5 мг залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу. Таблетки не ковтати і не розжовувати, а тримати в роті до повного розсмоктування. Добова доза для дорослих – 25 мг 5 разів на добу. Кратність прийому – 1 таблетка (12,5 мг) кожні 4-5 годин. Курс лікування – 7 днів.

## **Діти**

Немає досвіду застосування препарату дітям.

## **Передозування**

Можливе посилення побічних реакцій.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції, включаючи висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк, гіперемію.

*З боку травного тракту:* подразнення слизової оболонки ротової порожнини, нудота, блювання.

*З боку нервової системи:* головний біль, запаморочення.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

Таблетки по 12,5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 61057, Харківська обл., місто Харків, вулиця Воробйова, будинок 8.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).