

Состав

действующее вещество: 1 мл препарата содержит настойки плодов перца стручкового (*Capsicum annuum*) (1:10) (экстрагент - этанол 90%) 0,025 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%.

Лекарственная форма

Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желто-оранжевого до светло-красновато-оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает антисептическое и освежающее действие, обусловленное фармакологическими свойствами веществ, входящих в его состав.

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах перца стручкового (ароматический амин капсаицин, масло эфирное), при местном применении оказывают местнораздражающее, отвлекающее действие, вызывают локальное усиление кровообращения и гиперемии тканей в месте нанесения, способствуют выделению эндогенных биологически активных веществ, проявляют умеренную антибактериальную активность .

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучалась.

Показания

Для полоскания рта при пародонтозе, при зубной боли.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности слизистой оболочки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Не глотать внутрь.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Следует воздерживаться от управления автотранспортом или от других потенциально опасных видов деятельности, так как возможны такие побочные реакции, как головокружение, сонливость.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав лекарственного средства входит этиловый спирт, его не рекомендуется применять женщинам в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата разводить в 200 мл теплой кипяченой воды.

Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально врачом.

Дети

Не применять детям.

Передозировка

Возможно развитие повышенной чувствительности к препарату, усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Иногда могут возникать аллергические реакции, головокружение, сонливость, раздражение слизистой оболочки.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконах.

По 100 мл во флаконе в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).