

## **Состав**

*діюча речовина*: календули квітки (*Calendulae flores*);

1 пачка містить календули квіток (*Calendulae flores*) - 50 г;

## **Лекарственная форма**

Цветки.

*Основные физико-химические свойства*:

- *Цельное сырье*: цельные или частично осыпавшиеся корзинки, без цветоносов или с остатками цветоносов. Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый; срединных – оранжевый, желтовато-коричневый или желтый.
- *Измельченное сырье*: смесь измельченных цветолож, цветоносов, цельных или измельченных трубчатых и ложноязычковых цветков, листочков обертки. Цвет серо-зеленый, зеленый, красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый, желтовато-коричневый, желтый.
- *Порошок крупный*: кусочки различной формы цветолож, цветоносов, листочков обертки, трубчатых и ложноязычковых цветков, цельные трубчатые цветки. Цвет серо-зеленый, зеленый, красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый, желтовато-коричневый, желтый.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические средства. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Комплекс биологически активных веществ оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное, спазмолитическое и желчегонное действие, ускоряет процессы регенерации тканей, способствует заживлению язв и эрозий.

## **Показания**

Внутрь применяют при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах, воспалительных заболеваниях печени, желчевыводящих путей и селезенки; наружно – при заболеваниях полости рта (молочница у детей, гингивиты, пиорея, воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза), ангинах, тонзилитах – в составе

комплексной терапии.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

### **Способ применения и дозы**

*Цельная сырье:* 1 столовую ложку цельных цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3-7 лет - по 1 десертной ложке. Перед применением настой взболтать.

Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки.

*Измельченное сырье:* 1 десертную ложку измельченных цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана, дети 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3-7 лет - по 1 десертной ложке. Перед применением настой

взболтать.

Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Внутри препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

## **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.