#### Состав

действующие вещества: 100 мл препарата содержат настойки из смеси лекарственного растительного сырья «Фитодент®» (1:10) (экстрагент - этанол 40 %): Аира корневища (calami rhizomata) - 2 г; Ноготков цветки (calendulae officinalis flores) - 1,5 г; Крапивы листья (urticae dioicae folia) - 1 г; Ромашки цветки (chamomillae recutitae flores) - 1 г; Софоры японской плоды (sophorae japonicae fructus) - 2 г; Чистотела трава (chelidonii herba) - 1,5 г; Шиповника плоды (rosae fructus) - 1 г;

вспомогательные вещества: отсутствуют, кроме экстрагента.

### Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость красно-бурого цвета, с ароматным запахом. Допускается выпадение осадка.

#### Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Прочие средства для местного применения в стоматологии. Код ATX A01A D11.

#### Фармакодинамика

Фитодент® оказывает противовоспалительное, аналгезирующее, дезинфицирующее и фунгицидное действия, хорошо всасывается слизистой оболочкой полости рта и пародонта.

Кроме того, дубильные вещества и флавоноиды, которые содержатся в препарате, имеют ранозаживляющие, кровоостанавливающие и общеукрепляющие свойства. Благодаря наличию в составе препарата физиологически активных веществ, которые входят в состав ромашки, софоры и чистотела, препарат оказывает болеуспокаивающее действие.

#### Показания

Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта: стоматит катаральный; стоматит хронический рецидивирующий афтозный; пародонтит локализованный (хроническое или обострившееся течение) І степени; гингивит катаральный.

В виде полосканий при инфекционно-воспалительных процессах слизистой

оболочки глотки и гортани.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Детский возраст до 12 лет.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат усиливает действие противовоспалительных и аналгезирующих средств.

## Особенности применения

Фитодент® необходимо применять после удаления остатков пищи и зубных отложений. Препарат использовать только разведенным. Перед применением взболтать.

# Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

## Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применяют в период беременности и кормления грудью.

## Способ применения и дозы

Препарат разводить водой в различных соотношениях (1 часть препарата на 1 или 2 части воды или 1 чайная ложка препарата на ¼ стакана воды, в зависимости от индивидуальной чувствительности) и применять для полосканий, промываний и орошений (3—5 раз в сутки по 5 минут); а также для ротовых ванночек (3—5 раз в сутки по 2—3 минуты).

Лечение заболеваний пародонта осуществляют путем введения в десенные карманы и межзубное пространство турунд, обильно смоченных разведенным (1 часть препарата на 1 часть воды) раствором Фитодента® (1—2 раза в сутки по 15—20 минут); проведение аппликаций с разведенным (1 часть препарата на 1 часть воды) раствором Фитодента® (2—3 раза в сутки по 15—20 минут). Курс лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания; обычно продолжительность лечения составляет 12—14 дней.

#### Дети

Препарат не применять детям в возрасте до 12 лет.

#### Передозировка

При применении неразведенного препарата возможно появление чувства жжения.

#### Побочные реакции

При повышенной чувствительности к компонентам препарата возможно возникновение аллергических реакций, в том числе кожного зуда, покраснения, высыпания на коже, ангионевротического отека.

### Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

#### Упаковка

По 100 мл во флаконе или банке. По 1 флакону или банке в пачке из картона.

### Категория отпуска

Без рецепта.

#### Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

## Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

#### Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — <u>Государственного реестра лекарственных средств Украины.</u>