Состав

действующее вещество: ромашки цветки (Matricariae flores);

1 пачка содержит ромашки цветков (Matricariae flores) 40 г.

Лекарственная форма

Цветка.

Основные физико-химические свойства: измельченное сырье: смесь измельченных, частично осыпан цветочных корзин, трубчатых и несправжньоязичкових цветков, цветоложе. Цвет от светло-желтого до желтовато-зеленого с белыми, коричневатыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТХ А16А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают спазмолитическое, болеутоляющее, противовоспалительное, антисептическое, потогонное, желчегонное действие; снижают аллергические реакции, усиливают процессы регенерации, повышают секреторную деятельность пищеварительных желез, возбуждают аппетит, устраняют спазмы кишечника, уменьшают бродильные процессы.

Показания

Внутренне применять при гастритах, воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря, энтероколитах, метеоризме, простудных заболеваниях. Наружно - при воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

3 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ⅓ стакана, детям 12-14 лет - по ¼ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке, 1-3 лет - по 1 десертной ложке, 6 месяцев-1 год - по ½-1 чайной ложке. Наружно настой использовать для полосканий 3-4 раза в сутки. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применять детям в возрасте от 6 месяцев по назначению врача.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.