

## **Состав**

*действующее вещество* прицепы трава (*Bidentis herba*);

1 пачка содержит прицепы травы (*Bidentis herba*) 50 г.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев, стеблей, бутонов и цветков различной формы зеленого, буровато-зеленого, зеленовато-фиолетового цвета с грязноватый-желтыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические препараты. Код АТХ D11A X.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества травы оказывают мочегонное, потогонное, противовоспалительное, противоаллергическое, желчегонное и бактерицидное действие.

## **Показания**

Заболевания кожи аллергического характера, диатез, пиодермии, псориаз, экземы, нейродермиты. Заболевания мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ, аллергии простудные заболевания (ОРЗ, грипп) (в комплексном лечении).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

## **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана; детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана.

Наружно настой использовать для примочек и ванн.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента

## **Дети**

Внутри препарат не назначать детям до 12 лет.

## **Передозировка**

Возможно усиление побочных реакций.

## **Побочные реакции**

При гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница).

## **Срок годности**

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.