

Состав

действующее вещество прицепы трава (*Bidentis herba*);

1 пачка содержит прицепы травы (*Bidentis herba*) 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев, стеблей, бутонов и цветков различной формы зеленого, буровато-зеленого, зеленовато-фиолетового цвета с грязноватый-желтыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические препараты. Код АТХ D11A X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества травы оказывают мочегонное, потогонное, противовоспалительное, противоаллергическое, желчегонное и бактерицидное действие.

Показания

Заболевания кожи аллергического характера, диатез, пиодермии, псориаз, экземы, нейродермиты. Заболевания мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ, аллергии простудные заболевания (ОРЗ, грипп) (в комплексном лечении).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана; детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана.

Наружно настой использовать для примочек и ванн.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента

Дети

Внутри препарат не назначать детям до 12 лет.

Передозировка

Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

При гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница).

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.