Состав

действующие вещества: 1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: Сладкий корней (Liquiritiae radix) 120 мг, софоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 120 мг, алтея корней (Althaeae radix) 105 мг, крапивы листья (Urticae folium) 105 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folium) 105 мг, календулы цветков (Calendulae flos) 105 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 105 мг, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 105 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 105 мг, аира корней (Calami radix) 90 мг, бузины цветков (Sambuci flos) 90 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 90 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 90 мг, шалфея листья (Salviae officinalis folium) 90 мг, полыни горькой травы (Absinthii herba) 75 мг.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь кусочков разной формы серовато-зеленого цвета с коричневато-красными, оранжевыми, желтыми и белыми включениями. Запах слабый, приятный.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.

Код АТХ А16А Х.

Фармакодинамика

Гастрофит проявляет спазмолитические свойства, стимулирует репаративные процессы в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции пищеварительного тракта, нормализует моторику кишечника. Имеет также желчегонное и ветрогонное действие.

Показания

Хронический гастрит с сохраненной или пониженной кислотопродуцирующей функцией желудка; функциональная диспепсия дуоденит; профилактика рецидивов и в составе комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гипертоническая болезнь II Б-III ступеней, острая и хроническая сердечная недостаточность, гипокалиемия, обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, острый панкреатит, круп, обструктивный бронхит, спазмофилия, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови.

*Особые меры безопасности. В*о время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В период применения лекарственного средства следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами и работа с механизмами).

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственный препарат противопоказан в период беременности. При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.

Взрослым и детям старше 12 лет принимать в теплом виде по 150 мл за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. В среднем курс лечения составляет от 1 до 2 месяцев, при необходимости курс можно повторить.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций, диспепсические явления, отеки, повышение артериального давления.

Побочные реакции

Лекарственное средство обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая его многокомпонентный состав, в основном при индивидуальной гиперчувствительности к любому из компонентов или при нарушении режима приема, возможны аллергические реакции, в том числе зуд, сыпь, крапивница, дерматит, отек кожи, фотосенсибилизация. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакете, 20 фильтр-пакетов.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания« ЭЙМ ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лет. «А-5».