

Состав

действующее вещество: рябины черноплодной плоды (*Aroniae melanocarpaе fructus*).

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: плоды яблукopodobные, иногда с плодоножками, шаровидные. Цвет плодов черный, пурпурно-черный, мякоть фиолетово-красная, почти черная.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на метаболизм и на систему пищеварения. Код АТХ А16А Х.

Показания

Применять в комплексной терапии при гипо- и авитаминозах, геморрагических диатезах, кровотечениях различного происхождения, начальных стадиях артериальной гипертензии, тиреотоксикоза, атеросклероза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лекарственному средству. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит, тромбозы, тромбофлебиты, повышенная способность крови к свертыванию, выраженная артериальная гипотензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Действие лекарственного средства усиливается при одновременном приеме растений с содержанием аскорбиновой кислоты (плоды шиповника, черной смородины).

В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Нет данных.

Применение в период беременности или кормления грудью

Информация об опыте применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствует.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждать при комнатной температуре 45-60 минут, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по ½ стакана 3-4 раза в день после еды. Перед применением настой рекомендуется взболтать.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Дети

В связи с отсутствием достаточных клинических данных по применению лекарственного средства детям, его не следует назначать этой категории пациентов.

Передозировка

Усиление проявлений побочных реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции у лиц с гиперчувствительностью. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение

лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 150 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.