

Состав

действующее вещество: фиалки трава (Violae herba);

1 пачка содержит фиалки травы (Violae herba) 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства:

измельченное сырье: кусочки стеблей (зеленого, светло-зеленого или желтовато-зеленого цвета), листьев (зеленого цвета), плодов, цветков (фиолетового, синего, темно-синего, желтого, светло-желтого, бледно-фиолетового цвета) различной формы и отдельные семена светло-бурого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают антисептическое, противовоспалительное, бронхолитическое, отхаркивающее, слабое диуретическое, желчегонное и спазмолитическое действие.

Показания

Заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с затрудненным выделением мокроты (острые и хронические бронхиты, бронхопневмонии, коклюш), воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, мочекаменная болезнь - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к салицилатам. Гломерулонефрит, гепатит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке. Перед применением настоек взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Передозировка и длительное применение препарата приводит иногда к возникновению тошноты, рвоты, диареи, аллергических высыпаний на коже.

Побочные реакции

При гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции, в т. ч. высыпания на коже, тошнота, рвота, диарея.

При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.