Состав

действующее вещество: чабреца трава;

1 пачка содержит чабреца трава - 50 г;

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства:

измельченное сырье: кусочки листьев, веточек, стеблей, соцветий и отдельные цветки зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, желтовато-бурого, буровато-красного и синевато-фиолетового цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05CA.

Фармакодинамика

Чабреца трава содержит масло эфирное, флавоноиды, вещества дубильные и горькие, камедь, кислоты тритерпеновые (урсоловая и олеаноловая), соли минеральные. Препараты тимьяна оказывают отхаркивающее, антибактериальное, спазмолитическое и обезболивающее действие, успокаивающе действуют на центральную нервную систему, стимулируют выделение желудочного сока.

Показания

Заболевания дыхательных путей (ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхопневмонии) желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся секреторной недостаточностью желудка, атонией или спазмами кишечника, метеоризмом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства губоцветных (Lamiaceae), а также к сельдерея и пыльцы березы (возможна перекрестная реакция). Тяжелые заболевания печени и почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Если симптоматика сохраняется в течение одной недели или ухудшается во время лечения и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по ⅓ стакана 3-4 раза в день за 15-20 мин до еды. Детям 4-5 лет - по 1 десертной ложке, 5-7 лет - по 1 столовой ложке, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 12-14 лет - по ¼ стакана в возрасте от 14 лет - по ⅓ стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взболтать.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Не рекомендуется применять детям до 4 лет.

Передозировка

При передозировке возможны тошнота, дискомфорт, головную боль. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи), желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО "Лектравы".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.