

## **Состав**

*действующее вещество:* фенхеля плоды (*Foeniculi fructus*);

1 пачка содержит фенхеля плодов (*Foeniculi fructus*) 50 г.

## **Лекарственная форма**

Плоды.

*Основные физико-химические свойства:* плоды - вислоплодник, распадающихся на два полуплодики (мерикарпии). Внешняя сторона мерикарпии выпуклая, внутренняя - плоская. Каждый мерикарпий с пятью сильно выступающими продольными ребрышками. Цвет зеленовато-бурый.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при функциональных расстройствах пищеварительного тракта. Код АТС А03А Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества плодов оказывают секретолитическое, спазмолитическое, ветрогонное, противомикробное и слабое мочегонное действие.

## **Показания**

Спазмы кишечника, метеоризм, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано в период беременности. Усиливает лактацию в период кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 14 лет - по ½ стакана, детям 10-14 лет - по ¼ стакана, 7-10 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 десертной ложке, детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет - по 1 чайной ложке. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев.

### **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21