

Состав

действующее вещество: фенхеля плоды (*Foeniculi fructus*);

1 пачка содержит фенхеля плодов (*Foeniculi fructus*) 50 г.

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: плоды - вислоплодник, распадающихся на два полуплодики (мерикарпии). Внешняя сторона мерикарпии выпуклая, внутренняя - плоская. Каждый мерикарпий с пятью сильно выступающими продольными ребрышками. Цвет зеленовато-бурый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных расстройствах пищеварительного тракта. Код АТС А03А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества плодов оказывают секретолитическое, спазмолитическое, ветрогонное, противомикробное и слабое мочегонное действие.

Показания

Спазмы кишечника, метеоризм, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано в период беременности. Усиливает лактацию в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, детям 10-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-10 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 десертной ложке, детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет - по 1 чайной ложке. Перед применением настоек взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21