

Состав

действующее вещество: сенны листья;

1 фильтр-пакет содержит сенны листья - 2 г.

Лекарственная форма

Листья.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев, плодов, семян, стеблей, рахисы, плодоножек различной формы. Цвет листьев серовато-зеленый, коричневатозеленый, желтоватозеленый, плодов - зеленый, зеленоватокоричневый, желтоватокоричневый, коричневый.

Фармакотерапевтическая группа

Контактные слабительные средства. Код АТХ А06А В06.

Фармакодинамика

Сенны листья и плоды содержат флавоноиды, антрагликозиды (сенозидин А и В, реин, алоэ-эмодин), органические кислоты, смолистые вещества. Этот комплекс биологически активных веществ оказывает мягкое слабительное действие. Слабительное действие отвара из сенны листья и плодов проявляется через 6-10 часов после приема и обусловлена антрагликозидами, которые усиливают моторную функцию толстого кишечника.

Показания

Атония толстого кишечника, хронические запоры.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Метроррагии, паралитическая кишечная непроходимость, геморрой, острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит), перитонит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, трещины прямой кишки, спастический колит, ущемленная грыжа, панкреатит, гепатит, нефрит, цистит, боли в животе неустановленного генеза, тяжелые нарушения водно-электролитного баланса, тошнота, рвота, дивертикулит, органические

поражения печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение с хинидином сульфатом снижает уровень действующих веществ в сыворотке, с сердечными гликозидами - влечет сердечную аритмию, с антиаритмическими средствами, диуретиками и кортикостероидами - влечет мышечную слабость.

Особенности применения

Перед началом приема препарата необходимо, чтобы врач установил причину запора для исключения непроходимости кишечника. Препарат рекомендуется применять только в том случае, если нормализации стула не удастся добиться изменением диеты или применением препаратов, которые увеличивают объем кишечного содержимого. Чтобы избежать привыкания, препарат целесообразно чередовать с другими слабительными средствами и ограничить длительность применения 1 неделей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать до полного остывания. Принимать внутрь по 1 стакану на ночь или по $\frac{1}{4}$ стакана 1-3 раза в день. Детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 14-16 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, 16-18 лет - по $\frac{1}{2}$ стакана на ночь.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат применять детям старше 12 лет по рекомендации врача.

Передозировка

При передозировке возможны кишечные колики, диспепсия, диарея, нарушение водно-солевого баланса, что требует отмены препарата. Лечение симптоматическое. Длительное (до нескольких лет) применение больших доз препарата может вызвать атрофию гладкой мускулатуры толстой кишки и нарушение ее иннервации.

Побочные реакции

Аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница, локальная или генерализованная сыпь). Нарушение пищеварения, коликообразные боли в кишечнике, метеоризм, диарея, анорексия, изменение окраски мочи, псевдомеланоз кишечника, водно-электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипокальциемия), альбуминурия, гематурия, гиперальдостеронизм, нарушение сердечной деятельности, повышенная утомляемость, мышечная слабость, судороги.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 2 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.